

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

**Методические материалы для председателей и членов
предметных комиссий субъектов Российской Федерации
по проверке выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2018 года**

МАТЕМАТИКА

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОЦЕНИВАНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАНИЙ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ**

Москва
2018

Руководитель федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по математике И.В. Ященко, в.н.с. ФГБНУ «ФИПИ».

Авторы–составители: И.Р. Высоцкий, О.Н. Косухин, А.В. Семенов, А.С. Трепалин.

Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2018 г. по математике подготовлены в соответствии с Тематическим планом работ Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» на 2018 г. Пособие предназначено для подготовки экспертов по оцениванию заданий с развернутым ответом, которые являются частью контрольных измерительных материалов (КИМ) для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.

В методических материалах дается краткое описание структуры контрольных измерительных материалов 2018 г. по математике, характеризуются типы заданий с развернутым ответом, используемые в КИМ ЕГЭ по математике, и критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом, приводятся примеры оценивания выполнения заданий и даются комментарии, объясняющие выставленную оценку.

В пособии использованы работы участников ЕГЭ 2016–2017 гг.

Авторы будут благодарны за замечания и предложения по совершенствованию пособия.

© И.Р. Высоцкий, О.Н. Косухин, А.В. Семенов, А.С. Трепалин, 2018
© Федеральный институт педагогических измерений. 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. Критерии проверки и оценка решений задания 13 ЕГЭ–2018	5
2. Критерии проверки и оценка решений задания 14 ЕГЭ–2018	17
3. Критерии проверки и оценка решений задания 15 ЕГЭ–2018	27
4. Критерии проверки и оценка решений задания 16 ЕГЭ–2018	38
5. Критерии проверки и оценка решений задания 17 ЕГЭ–2018	49
6. Критерии проверки и оценка решений задания 18 ЕГЭ–2018	59
7. Критерии проверки и оценка решений заданий 19 ЕГЭ-2018.....	74
Указания по оцениваю развернутых ответов участников ЕГЭ для эксперта, проверяющего развёрнутые ответы на задания 13–19 по МАТЕМАТИКЕ	84

ВВЕДЕНИЕ

Общие позиции и характер оценивания выполнения заданий в целом повторяют прошлогодние. Небольшие видоизменения и корректировки формулировок в содержании критериев оценивания для конкретного задания могут иметь место в тех случаях, когда необходимость подобного рода уточнений диктуется содержанием и структурой самого задания.

Более подробное описание заданий с развернутым ответом и критериев оценивания их выполнения представлены ниже, в начале каждого из параграфов 1–7.

Извлечения из Методических рекомендаций Рособрнадзора по формированию и организации работы предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

Во время работы экспертам запрещается:

- самостоятельно изменять рабочие места;
- копировать и выносить из помещений, где осуществляется проверка, экзаменацоные работы, критерии оценивания, протоколы проверки экзаменацоных работ, а также разглашать посторонним лицам информацию, содержащуюся в указанных материалах;
- иметь при себе и (или) пользоваться средствами связи, фото и видеоаппаратурой, портативными персональными компьютерами (ноутбуками, КПК и другими), кроме специально оборудованного в помещениях ПК рабочего места с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для обеспечения возможности уточнения экспертами изложенных в экзаменацоных работах участников ГИА фактов (например, сверка с источниками, проверка приведенных участниками ГИА фамилий, названий, фактов и т.п.);
- без уважительной причины покидать аудиторию;
- переговариваться, если речь не идет о консультации у председателя ПК или у эксперта, назначенного по решению председателя ПК консультантом; если у эксперта возникают вопросы или проблемы, он должен обратиться к председателю ПК или лицу,енному председателем ПК консультантом.

1. Критерии проверки и оценка решений задания 13 ЕГЭ–2018

Задание №13 – тригонометрическое, логарифмическое или показательное уравнение.

Выделение решения уравнения в отдельный пункт *a* прямо указывает участникам экзамена на необходимость полного решения предложенного уравнения: при отсутствии в тексте конкретной работы ответа на вопрос п. *a* задание №13 оценивается 0 баллов.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>a</i> ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов — пункта <i>a</i> и пункта <i>b</i>	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задача 13 (демонстрационный вариант 2018 г.).

а) Решите уравнение $\cos 2x = 1 - \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $\left[-\frac{5\pi}{2}; -\pi\right)$.

Решение. а) Преобразуем уравнение:

$$1 - 2\sin^2 x = 1 - \sin x; 2\sin^2 x - \sin x = 0; \sin x(2\sin x - 1) = 0,$$

откуда $\sin x = 0$ или $\sin x = \frac{1}{2}$.

Из уравнения $\sin x = 0$ находим: $x = \pi n$, где $n \in \mathbb{Z}$.

Из уравнения $\sin x = \frac{1}{2}$ находим: $x = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n$, где $n \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни уравнения, принадлежащие промежутку $\left[-\frac{5\pi}{2}; -\pi\right)$.

Получаем числа: -2π ; $-\frac{11\pi}{6}$; $-\frac{7\pi}{6}$.

Ответ: а) πn , $(-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.


б) -2π ; $-\frac{11\pi}{6}$; $-\frac{7\pi}{6}$.

Комментарий.

Множество корней может записано по-другому, например, πn , $n \in \mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{6} + 2\pi m$,

$m \in \mathbb{Z}$; $\frac{5\pi}{6} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Отбор корней может быть произведен любым другим способом: с помощью графика, решения двойных неравенств и т.п.



Примеры оценивания решений задания 13

Пример 1.

а) Решите уравнение $\cos 2x + 2 = \sqrt{3} \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Ответ: а) $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{8\pi}{3}; -\frac{7\pi}{3}$.

13) а) $\cos 2x + 2 = \sqrt{3} \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$

$$\begin{aligned} 1 - 2\sin^2 x + 2 &= -\sqrt{3} \sin x \\ -2\sin^2 x + \sqrt{3} \sin x + 3 &= 0 \end{aligned}$$

Пусть $\sin x = t$, тогда

$$-2t^2 + \sqrt{3}t + 3 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = (\sqrt{3})^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 3 = 3 + 24 = 27$$

$$t = \frac{-\sqrt{3} \pm 3\sqrt{3}}{-4} \quad t_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad t_2 = \sqrt{3}$$

Значит, $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ или $\sin x = \sqrt{3}$

1) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$x_1 = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

$$x_2 = \frac{4\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

2) $\sin x = \sqrt{3}$ — нет решений, т.к. $|\sqrt{3}| > 1$

б) Найдем корни уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$

1) $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$

$$-3\pi \leq -\frac{\pi}{3} + 2\pi k \leq -\frac{3\pi}{2}$$

$$-3 \leq -\frac{1}{3} + 2k \leq -\frac{3}{2}$$

$$-\frac{9}{3} + \frac{1}{3} \leq 2k \leq -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}$$

$$-\frac{8}{3} \leq 2k \leq -\frac{1}{2}$$

$$-\frac{16}{6} \leq k \leq -\frac{3}{6}$$

$$-\frac{16}{12} \leq k \leq -\frac{3}{12}$$

$$-1\frac{1}{3} \leq k \leq -\frac{1}{12}, \text{ т.к. } k \in \mathbb{Z}, \text{ но } k = -1$$

Если $k = -1$, то $x = -\frac{\pi}{3} - 2\pi = -\frac{\pi}{3} - 2\pi \frac{1}{2} - \frac{8\pi}{3} = -\frac{19\pi}{3}$

2) $-3\pi \leq \frac{4\pi}{3} + 2\pi n \leq -\frac{3\pi}{2}$

$$-3\pi - \frac{4\pi}{3} \leq 2\pi n \leq -\frac{3\pi}{2} - \frac{4\pi}{3}$$

$$-\frac{13\pi}{3} \leq 2\pi n \leq -\frac{17\pi}{6}$$

$$-\frac{13}{6} \leq n \leq -\frac{17}{12}$$

$$-\frac{11}{12} \leq n \leq -\frac{17}{12}$$

$$-2\frac{1}{6} \leq n \leq -\frac{17}{12} \Rightarrow -1\frac{5}{12}, n \in \mathbb{Z}$$

$$n = -2$$

Если $n = -2$, то $x = \frac{4\pi}{3} - 4\pi = -\frac{8\pi}{3}$

Ответ: а) $-\frac{\pi}{3} + 2\pi k; \frac{4\pi}{3} + 2\pi n; k \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}$

б) $-\frac{8\pi}{3}; -\frac{19\pi}{3}$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в обоих пунктах.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 2.

а) Решите уравнение $\cos 2x + 2 = \sqrt{3} \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Ответ: а) $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{8\pi}{3}; -\frac{7\pi}{3}$.

13) а) $\cos 2x + 2 = \sqrt{3} \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$
 $\cos 2x + 2 = \sqrt{3} - (-\sin x)$
 $1 - 2 \sin^2 x + 2 = -\sqrt{3} \sin x$
 $-2 \sin^2 x + 3 + \sqrt{3} \sin x = 0$
 Пусть $\sin x = y$
 Тогда
 $-2y^2 + 3 + \sqrt{3}y = 0$
 $D = \sqrt{3} - 4 \cdot 3 \cdot (-2) = \sqrt{27} > 0$ 2 корня
 $y_1 = \frac{-\sqrt{3} + \sqrt{27}}{-4} = \frac{-\sqrt{3} + 3\sqrt{3}}{-4} = \frac{2\sqrt{3}}{-4} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
 $y_2 = \frac{-\sqrt{3} - \sqrt{27}}{-4} = \frac{-\sqrt{3} - 3\sqrt{3}}{-4} = \frac{-4\sqrt{3}}{-4} = \sqrt{3}$
 Обратимо $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ $\sin x = \sqrt{3}$
 б) $x = (-1)^n \cdot \left(-\frac{\pi}{3}\right) + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ нет решений
 $\sin x \in [-$
 При $n = 0$
 $x = -\frac{\pi}{3} \notin \left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$
 При $n = -1$
 $x = \frac{\pi}{3} - \pi = -\frac{2\pi}{3} \notin \left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$
 При $n = -2$
 $x = -\frac{\pi}{3} - 2\pi = -\frac{7\pi}{3} \in \left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$
 При $n = -3$
 $x = \frac{\pi}{3} - 3\pi = -\frac{8\pi}{3} \in \left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$
 Ответ: а) $x = (-1)^n \cdot \left(-\frac{\pi}{3}\right) + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
 б) $-\frac{8\pi}{3}; -\frac{7\pi}{3}$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте а, но отбор корней нельзя назвать обоснованным, так как перебор остановлен на корне, принадлежащем отрезку. Типичный пример выставления 1 балла.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 3.

а) Решите уравнение $\cos 2x + 2 = \sqrt{3} \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Ответ: а) $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{8\pi}{3}; -\frac{7\pi}{3}$.

$$13 \quad a) \cos 2x + 2 = \sqrt{3} \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$$

$$\cos^2 x - \sin^2 x + 2 = \sqrt{3} \cdot \sin x$$

$$1 - \sin^2 x - \sin^2 x - \sqrt{3} \sin x + 2 = 0$$

$$-2 \sin^2 x - \sqrt{3} \sin x + 3 = 0$$

$$2 \sin^2 x + \sqrt{3} \sin x - 3 = 0$$

$$\text{замена } \sin x = t, t \in [-1; 1]$$

$$2t^2 + \sqrt{3}t - 3 = 0$$


$$D = 3 - 4 \cdot 2 \cdot (-3) = 3 + 24 = 27 = (3\sqrt{3})^2$$

$$t_1 = \frac{-\sqrt{3} + 3\sqrt{3}}{4} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad t_2 = \frac{-\sqrt{3} - 3\sqrt{3}}{4} = -\frac{4\sqrt{3}}{4} = -\sqrt{3}$$

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin x = -\sqrt{3}; -\sqrt{3} \notin [-1; 1]$$

$$x = (-1)^k \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$



Ответ: а) $(-1)^k \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$;
б) $-\frac{5\pi}{3}$.

Комментарий.

Тригонометрическое уравнение решено неверно. Во второй строчке в правой части отсутствует знак минус – ошибка в формуле приведения. Пункт а не выполнен не из-за вычислительной ошибки.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 4.

а) Решите уравнение $9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi \right]$.

Ответ: а) $\pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{3} + 2\pi l$, $l \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) $3\pi; \frac{11\pi}{3}$.

$$\begin{aligned}
 & 13. \quad 9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0 \\
 & 9 \cdot (9^{\cos x})^2 - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0 \\
 & 9^{\cos x} = t, \text{ тогда} \\
 & 9t^2 - 28t + 3 = 0 \\
 & D = 784 - 108 = 676 \\
 & t_1 = \frac{28 + 26}{18} = \frac{54}{18} = 3 \quad t_2 = \frac{28 - 26}{18} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9} \\
 & 9^{\cos x} = 3 \quad 9^{\cos x} = \frac{1}{9} \\
 & \cos x = 1 \quad \cos x = -1 \\
 & x_1 = \pi + 2\pi k, \text{ нет} \quad x_2 = \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \text{ нет.}, \text{ обобщенный} \\
 & x_1 \text{ и } x_2 \text{ получали } x = \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi k}{3}, \text{ нет} \\
 & \text{б) } \frac{11\pi}{3}; 3\pi; 4\pi \in \left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi \right] \\
 & \text{Ответ: а) } \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi k}{3}, \text{ нет, б) } 3\pi, \frac{11\pi}{3}; 4\pi.
 \end{aligned}$$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте а, но при отборе корней отсутствует решение и ошибочно указано число, которое не является корнем тригонометрического уравнения. Типичный пример выполнения задания на 1 балл.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 5.

а) Решите уравнение $9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

Ответ: а) $\pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{3} + 2\pi l$, $l \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) $3\pi; \frac{11\pi}{3}$.

$$13. \text{ a) } 9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$$

$$9 \cdot 3^{\cos x} - 28 \cdot 3^{\cos x} + 3 = 0$$

$$\text{Пусть } 3^{\cos x} = t, \text{ то}$$

$$9 \cdot t^2 - 28 \cdot t + 3 = 0$$

$$D = 784 - 4 \cdot 9 \cdot 3 = 676$$

$$t_1 = \frac{28 - 26}{18} = \frac{1}{9}$$

$$t_2 = \frac{28 + 26}{18} = 3$$

$$3^{\cos x} = \frac{1}{9}$$

$$3^{\cos x} = 3^{-2}$$

$$\cos x = -1$$

$$x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\delta) \quad \left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi \right]$$

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \text{ не подходит.}$$

$$1. \quad x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

$$+2,5\pi < -\frac{\pi}{3} + 2\pi k < 4\pi \quad | : \pi$$

$$2,5 < -\frac{1}{3} + 2\pi k < 4$$

$$2\frac{5}{6} + \frac{2}{6} < 2k < 4\frac{1}{3} \quad | : 2$$

$$1\frac{5}{6} < k < 2\frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow k = 2 \quad x = -\frac{\pi}{3} + 4\pi = \frac{11\pi}{3}$$

$$2. \quad x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

$$2,5\pi < \pi + 2\pi k < 4\pi \quad | : \pi - 1$$

$$2,5 - 1 < 2\pi k < 4 - 1 \quad | : 2$$

$$0,75 < k < 1,5$$

$$\Rightarrow k = 1$$

$$x = \pi + 2\pi = 3\pi.$$

$$3. \quad x = -\pi + 2\pi k$$


$$2,5\pi < -\pi + 2\pi k < 4\pi \quad | : \pi$$

$$1,75 < k < 2,5$$

$$\Rightarrow k = 2$$

$$x = -\pi + 4\pi = 3\pi.$$

$$\text{Ответ: } x = 3\pi, x = \frac{11\pi}{3}$$



Комментарий.

В записи корней первого простейшего уравнения содержится дублирующая запись корней, но ошибки в этом нет. При отборе корней допущены ошибки при делении $2\frac{5}{6}$ и $4\frac{1}{3}$ на 2.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 6.

а) Решите уравнение $9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

Ответ: а) $\pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{3} + 2\pi l$, $l \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) $3\pi; \frac{11\pi}{3}$.

$$13. \text{ а) } 9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$$

$$9 \cdot (9^x)^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$$

Пусть $9^{\cos x} = t$, тогда:

$$9t^2 - 28t + 3 = 0$$

$$\mathcal{D} = (-28)^2 - 4 \cdot 9 \cdot 3 = 784 - 108 = 676$$

$$t_1 = \frac{28-26}{2 \cdot 9} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}; \quad t_2 = \frac{28+26}{2 \cdot 9} = \frac{54}{18} = 3$$

$$\text{Вернемся к замене: } 9^{\cos x} = \frac{1}{9} \quad \text{или} \quad 9^{\cos x} = 3$$

$$\cos x = -1 \quad x = \pi + \pi d, d \in \mathbb{Z}$$

$$(3^x)^{\cos x} = 3$$

$$2 \cos x = 1, \quad \cos x = \frac{1}{2}$$

$$x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$\text{б) } \left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$$

$$\frac{5\pi}{2} \leq \frac{\pi}{3} + 2\pi n \leq 4\pi; \quad \frac{5\pi}{2} \leq -\frac{\pi}{3} + 2\pi k \leq 4\pi$$

$$\frac{5}{2} \leq \frac{1}{3} + 2n \leq 4, n \in \mathbb{Z} \quad \frac{5}{2} \leq -\frac{1}{3} + 2k \leq 4, k \in \mathbb{Z}$$

$$2\frac{1}{6} \leq 2n \leq 3\frac{2}{3}, n \in \mathbb{Z} \quad 2\frac{5}{6} \leq 2k \leq 4\frac{1}{3}, k \in \mathbb{Z}$$

$$1\frac{1}{6} \leq n \leq 1\frac{5}{6}, n \in \mathbb{Z} \quad 1\frac{5}{6} \leq k \leq 2\frac{1}{6}, k \in \mathbb{Z}$$

$$n - \text{нечетные числа} \quad k = 2$$

$$\frac{5\pi}{2} \leq \pi + \pi d \leq 4\pi$$

$$\frac{5}{2} \leq 1 + d \leq 4, d \in \mathbb{Z}$$

$$1\frac{1}{2} \leq d \leq 3, d \in \mathbb{Z}$$

$$d = 2, 3$$

$$x_2 = \pi + 2\pi = 3\pi$$

$$x_1 = -\frac{\pi}{3} + 2 \cdot 2\pi = \frac{11\pi}{3}$$

$$x_3 = \pi + 4\pi = 5\pi$$

Ответ: а) $x = \pi + \pi d, d \in \mathbb{Z}$; $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;

$$\text{б) } x_1 = \frac{11\pi}{3}; \quad x_2 = 3\pi; \quad x_3 = 5\pi$$

Комментарий.

Тригонометрическое уравнение $\cos x = -1$ решено неверно.

Оценка эксперта: 0 баллов.


Пример 7.

а) Решите уравнение $2\log_4(4\sin x) - 5\log_4(4\sin x) + 2 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; $\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{7\pi}{6}$.

а) $2\log_4(4\sin x) - 5\log_4(4\sin x) + 2 = 0, \log_4(4\sin x) = t,$
 $2t^2 - 5t + 2 = 0; D = 25 - 16 = 9 = 3^2, t_1 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}; t_2 = \frac{5+3}{4} = 1;$
 $\log_4(4\sin x) = t_1 = \frac{1}{2}; \log_4(4\sin x) = \log_4 2, 4\sin x = 2; \sin x = \frac{1}{2};$
 $x \in \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$
 $\log_4(4\sin x) = t_2 = 1; \log_4(4\sin x) = \log_4 4; 4\sin x = 4; \sin x = 1;$
 $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ Ответ: $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

б) 

Ответ: $-\frac{3\pi}{2}, -\frac{7\pi}{6}$.

Комментарий.

Получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки при вычислении t_2 , но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов — пункта а и пункта б

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 8.

а) Решите уравнение $2\log_4(4\sin x) - 5\log_4(4\sin x) + 2 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{7\pi}{6}$.

13) а) ОДЗ: $4\sin x > 0$
 $\sin x > 0$

Для таких x решим методом интервалов
 $\log_4(4\sin x) = t; t \geq 0$

$$2t^2 - 5t + 2 = 0$$

$$D = 25 - 4 \cdot 2 \cdot 2$$

$$D = 25 - 16$$

$$D = 9$$

$$t_1 = \frac{5+3}{2} \quad t_1 = 4$$

$$t_2 = \frac{5-3}{2} \quad t_2 = 1$$

Обратная замена

$$\log_4(4\sin x) = 1 \quad \text{или} \quad \log_4(4\sin x) = 4$$

$$4\sin x = 4$$

$$4\sin x = 256$$


$$\sin x = 1$$

$$\sin x = 64$$

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

Нет решений.

б) Приведём отсюда на единичной окружности



$$-\frac{3\pi}{2}$$

$$\text{Ответ: а) } x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \text{ б) } -\frac{3\pi}{2}$$

Комментарий.

Получены неверные ответы не из-за вычислительной ошибки при вычислении корней квадратного уравнения.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 9.

a) Решите уравнение $2\log_4^2(4\sin x) - 5\log_4(4\sin x) + 2 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; $\frac{5\pi}{6} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{7\pi}{6}$.

$$a) 2 \log_4^2(4 \sin x) - 5 \log_4(4 \sin x) + 2 = 0$$

Пусть $\log_4(4\sin x) = t$, тогда:

$$2t^2 - 5t + 2 = 0$$

$$d = 25 - 16 = 9 = (3)^2$$

$$t_1 = \frac{5+3}{4} = 2 ; \quad t_2 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2} ;$$

$$(4) \log_4(4 \sin x) = 2;$$

$$4 \sin x = 16;$$

$\sin x = y$ - takuk x
ne cijevet bujet, tak kac
 $\sin \in [-1; 1]$,

~~10~~ 8) $[-\frac{3\pi}{2}; 0]$

$$(2) \log_4 (4 \sin x) = \frac{1}{2};$$

$$4 \sin x = 2$$

$$\sin x = \frac{1}{2} ;$$

$$x = \frac{n}{c} + ?D$$


$$x = \frac{\pi}{6} + 2D_n \quad \text{or} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2D_n,$$

страгас и корни;

но копен $\frac{D}{6} + 2D$ ~~и~~ не при каких

уравнения не имеет решения $[-\frac{3\pi}{2}, 0]$

корень $\frac{5\pi}{6} + 2D_n$ не может на
этот отрезок б. Так как $\frac{5\pi}{6} - 2D = -\frac{7\pi}{6}$.



$$\text{Orter: a) } \frac{\pi}{6} + 2\pi n; \quad \frac{5\pi}{6} + 2\pi n; \quad \text{b) } -\frac{3\pi}{6}.$$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте *a*, но отбор корней с помощью тригонометрической окружности в этом решении нельзя считать обоснованным. Типичный пример выполнения задания на 1 балл.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 10.


а) Решите уравнение $2\log_4(4\sin x) - 5\log_4(4\sin x) + 2 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; $\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{7\pi}{6}$.

№ 13 $2\log_4(4\sin x) - 5\log_4(4\sin x) + 2 = 0$ $\log_4(4\sin x) = t$ $\log_4(4\sin x) = t$ $4\sin x \neq 0$
 $2t^2 - 5t + 2 = 0$ $D = 25 - 16 = 9$ $\sin x \neq 0$
 $x \neq \pi k$ $t \in \mathbb{Z}$

$\begin{cases} \log_4(4\sin x) = 2 \\ \log_4(4\sin x) = \frac{1}{2} \end{cases}$ $\begin{cases} 8 = 4\sin x \\ 2 = 4\sin x \end{cases}$ $\begin{cases} \sin x = 2 \\ \sin x = \frac{1}{2} \end{cases}$ $t_1 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$
 $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$ $t_2 = \frac{5+3}{4} = 2$
 $x \in \left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$ $\text{не подходит т.к. } \sin x \leq 1$



Отв: а) $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$
б) $x \in \left[-\frac{7\pi}{6}; 0\right] \quad n \in \mathbb{Z}$

Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$; б) $-\frac{7\pi}{6}$.

Комментарий.

При решении простейшего логарифмического уравнения допущена ошибка, которая не является вычислительной, кроме того, при нахождении ОДЗ допущена ошибка, которая никак не может быть отнесена к вычислительной. Любая из этих ошибок уже не позволяет выставить положительный балл. Типичный пример выставления 0 баллов.

Оценка эксперта: 0 баллов.

2. Критерии проверки и оценка решений задания 14 ЕГЭ–2018

Задание 14 – стереометрическая задача, она разделена на пункты *а* и *б*. Для получения 2 баллов нужно, чтобы были выполнены оба пункта, а для получения 1 балла хватает выполнения одного из этих пунктов.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта <i>а</i> и обоснованно получен верный ответ в пункте <i>б</i>	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта <i>а</i> ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте <i>б</i> с использованием утверждения пункта <i>а</i> , при этом пункт <i>а</i> не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задача 14 (демонстрационный вариант 2018 г.).

Все рёбра правильной треугольной призмы $ABC A_1 B_1 C_1$ имеют длину 6. Точки M и N — середины рёбер AA_1 и A_1C_1 соответственно.

- Докажите, что прямые BM и MN перпендикулярны.
- Найдите угол между плоскостями BMN и ABB_1 .

Решение. а) Пусть точка H — середина AC . Тогда

$$BN^2 = BH^2 + NH^2 = (3\sqrt{3})^2 + 6^2 = 63.$$

Вместе с тем,

$$BM^2 + MN^2 = (3^2 + 6^2) + (3^2 + 3^2) = 63,$$

а тогда по теореме, обратной теореме Пифагора, треугольник BMN является прямоугольным с прямым углом M .

б) Проведём перпендикуляр NP к прямой A_1B_1 . Тогда $NP \perp A_1B_1$ и $NP \perp A_1A$. Следовательно, $NP \perp ABB_1$. Поэтому MP — проекция MN на плоскость ABB_1 .


Прямая BM перпендикулярна MN , тогда по теореме о трёх перпендикулярах $BM \perp MP$. Следовательно, угол NMP — линейный угол искомого угла.

Длина NP равна половине высоты треугольника $A_1B_1C_1$, то есть $NP = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Поэтому $\sin \angle NMP = \frac{NP}{MN} = \frac{3\sqrt{3}}{2 \cdot 3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{8}}$.

Следовательно, $\angle NMP = \arcsin \sqrt{\frac{3}{8}}$.

Ответ: б) $\arcsin \sqrt{\frac{3}{8}}$.



Задание 1

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона AB основания равна 6, а боковое ребро AA_1 равно 3. На рёбрах AB и B_1C_1 отмечены точки K и L соответственно, причём $AK = B_1L = 2$. Точка M — середина ребра A_1C_1 . Плоскость γ параллельна прямой AC и содержит точки K и L .

- Докажите, что прямая BM перпендикулярна плоскости γ .
- Найдите объём пирамиды, вершина которой — точка M , а основание — сечение данной призмы плоскостью γ .

Решение.

а) Проведём через точки K и L прямые, параллельные AC . Пусть эти прямые пересекают рёбра BC и A_1B_1 в точках K_1 и L_1 соответственно (рис. 1). Тогда трапеция KL_1LK_1 является сечением исходной призмы плоскостью γ . Рассмотрим плоскость BB_1M . Пусть эта плоскость пересекает прямые AC , KK_1 и LL_1 в точках N , E и F соответственно. Четырёхугольник BB_1MN — прямоугольник, причём $BB_1 = 3$, $B_1M = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot A_1B_1 = 3\sqrt{3}$.

Кроме того, $NE : EB = AK : KB = 1 : 2$, $B_1F : FM = B_1L : LC_1 = 1 : 2$, откуда $MF = 2\sqrt{3}$, $NE = \sqrt{3}$. Пусть EH — высота трапеции $EFMN$ (рис. 2), тогда $FH = MF - NE = \sqrt{3}$.

Поскольку $\tg \angle MFE = \frac{EH}{FH} = \sqrt{3} = \frac{MB_1}{BB_1} = \tg \angle MBB_1$,

$$\angle MFE = \angle MBB_1 = 90^\circ - \angle BMF,$$

то есть прямые EF и BM перпендикулярны.

Прямая KK_1 параллельна прямой AC , которая перпендикулярна плоскости BB_1M . Значит, прямые KK_1 и EF перпендикулярны прямой BM , поэтому прямая BM перпендикулярна плоскости γ .

б) Расстояние от точки M до плоскости γ равно $MF \cdot \sin \angle MFE$, а площадь трапеции KL_1LK_1 равна

$$\frac{KK_1 + LL_1}{2} \cdot EF = \frac{\frac{2}{3}AC + \frac{1}{3}A_1C_1}{2} \cdot \frac{EH}{\sin \angle MFE} = \frac{9}{\sin \angle MFE}.$$

Значит, искомый объём равен $\frac{1}{3} \cdot MF \cdot \sin \angle MFE \cdot \frac{9}{\sin \angle MFE} = 6\sqrt{3}$.

Ответ: б) $6\sqrt{3}$.




Рис. 1




Рис. 2

Задание 2

Основанием четырёхугольной пирамиды $PABCD$ является трапеция $ABCD$, причём $\angle BAD + \angle ADC = 90^\circ$. Плоскости PAB и PCD перпендикулярны плоскости основания, K — точка пересечения прямых AB и CD .

- Докажите, что плоскости PAB и PCD перпендикулярны.
- Найдите объём пирамиды $KBCP$, если $AB = BC = CD = 4$, а высота пирамиды $PABCD$ равна 9.


Решение.

а) Заметим, что $\angle AKD = 90^\circ$. Плоскости PAB и PCD перпендикулярны плоскости основания, поэтому они пересекаются по прямой, содержащей высоту пирамиды. Значит, PK — высота пирамиды. Таким образом, угол $\angle AKD$ является линейным углом двугранного угла между плоскостями PAB и PCD . Значит, они перпендикулярны.

б) Поскольку $AB = CD$, трапеция $ABCD$ является равнобедренной. Значит,

$$\angle BAD = \angle ADC = \angle KBC = \angle KCB = 45^\circ;$$

$$BK = CK = \frac{\sqrt{2}}{2} BC = 2\sqrt{2}.$$



Таким образом, площадь треугольника KBC равна $S_{KBC} = \frac{BK \cdot CK}{2} = 4$,

а объём пирамиды $KBCP$ равен $\frac{PK \cdot S_{KBC}}{3} = 12$.

Ответ: б) 12.

Примеры оценивания выполнения задания 14

Пример 1.


В правильной треугольной призме $ABC A_1 B_1 C_1$ сторона AB основания равна 6, а боковое ребро AA_1 равно 3. На рёбрах AB и $B_1 C_1$ отмечены точки K и L соответственно, причём $AK = B_1 L = 2$. Точка M — середина ребра $A_1 C_1$. Плоскость γ параллельна прямой AC и содержит точки K и L .

а) Докажите, что прямая BM перпендикулярна плоскости γ .

б) Найдите объём пирамиды, вершина которой — точка M , а основание — сечение данной призмы плоскостью γ .

Ответ: б) $6\sqrt{3}$.

1.14



Решение.

Дано

$ABC A_1 B_1 C_1$ — прав. треуг. призм.

$AA_1 = 3$, $AB = 6$, $AK = 2$,

$B_1 L = 2$. $A, M = M C_1 = 3$.

γ — плоскость $\parallel AC$ и

прям. содержащая K, L .

а) Док-р $BM \perp \gamma$

б) $V = AKK_1LL_1$

$$EG \parallel BF, RE = B, B. \quad EG = FB - (FZ + GB) \quad FZ = GB = \sqrt{3} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$$

$$EG = 3\sqrt{3} - (\sqrt{3} + \sqrt{3}) = \sqrt{3}. \quad RZ = \sqrt{RE^2 + EG^2} = \sqrt{3^2 + 3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$\Delta BFM \sim \Delta BZG$ по $\angle BFM = \angle BZG$ и $\angle BFM = \angle BZG$

$\Delta EOB \sim \Delta MOB$ т.к. $\angle MOB = \angle EOB$ (т.к. они вертикальные),

$EB = MR = 2\sqrt{3}$, $\angle EBM = \angle OM R$ т.к. это внеш. углы при $\angle EBM = \angle OM R$ и $\angle EBM = \angle OM R$

и $\angle EBM = \angle OM R$ т.к. $EB \parallel OM$ и $EB \parallel OM$. след. $\angle EBM = \angle OM R$

по теореме логарифм. $EB = \sqrt{EO^2 + ZO^2} = 2\sqrt{3} = \sqrt{3^2 + 3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

и $\angle EBO$ — прямой: след. $BO \perp ER$. след. $BO \perp \gamma$ след. $BM \perp \gamma$.

$$V = \frac{1}{3} MO \cdot SKK_1LL_1 = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \left(\frac{KK_1 + LL_1}{2} \cdot RZ \right) = \frac{1}{3} \cdot \left(2 + 2 \right) \cdot 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

Ответ: $4\sqrt{3}$.

1.17.

Ответ: $6\sqrt{3}$.

Комментарий.

Доказательство утверждения в пункте а недостаточно обосновано. С использованием утверждения пункта а верно получен ответ в пункте б.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 2.

В правильной треугольной призме $ABC A_1 B_1 C_1$ сторона AB основания равна 6, а боковое ребро AA_1 равно 3. На рёбрах AB и $B_1 C_1$ отмечены точки K и L соответственно, причём $AK = B_1 L = 2$. Точка M — середина ребра $A_1 C_1$. Плоскость γ параллельна прямой AC и содержит точки K и L .

- Докажите, что прямая BM перпендикулярна плоскости γ .
- Найдите объём пирамиды, вершина которой — точка M , а основание — сечение данной призмы плоскостью γ .

Ответ: б) $6\sqrt{3}$.

114

а) $BM \perp \gamma$ (доказательство)

Пусть PK — проекция BM на плоскость γ . Т.к. $BM \perp PK$, то $BM \perp \gamma$.

б) $V_{MPLN} = \frac{1}{3} \cdot MO \cdot S_{KPLN}$

Из $\triangle B_1 C_1$ по теореме о 3-х перпендикулярах $BM \perp PK$.

Проведём QH ($QH \perp NL$ и $QH \perp PK$ по признаку)

$\angle MOH = \angle MB_1B = 90^\circ$. Т.к. $BM \perp PK$ и $BM \perp QH$ $\Rightarrow BM \perp \gamma$.

По теореме о 3-х перпендикулярах $BM \perp \gamma$.

По теореме Пифагора $BM = 6$ $\Rightarrow BO = 3$.

Из $\triangle B_1 C_1$ по теореме Пифагора $B_1 H = \sqrt{3}$.

Из $\triangle B_1 B$ по теореме Пифагора $BH = 2\sqrt{3}$.

Из $\triangle BOH$ по теореме Пифагора $OH = \sqrt{3}$.

($\bigtriangleup QH$ делит QH пополам $\Rightarrow QH = 2OH = 2\sqrt{3}$)

$V_{MPLN} = \frac{1}{3} \cdot MO \cdot S_{KPLN} = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot \frac{2+4}{2} \cdot 2\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$

($KPLN$ — правильная трапеция)

Ответ: $6\sqrt{3}$

Комментарий.

Утверждение в пункте а не доказано. В основе решения пункта б лежит не обоснованное утверждение.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 3.

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона AB основания равна 6, а боковое ребро AA_1 равно 3. На рёбрах AB и B_1C_1 отмечены точки K и L соответственно, причём $AK = B_1L = 2$. Точка M — середина ребра A_1C_1 . Плоскость γ параллельна прямой AC и содержит точки K и L .

- Докажите, что прямая BM перпендикулярна плоскости γ .
- Найдите объём пирамиды, вершина которой — точка M , а основание — сечение данной призмы плоскостью γ .

Ответ: б) $6\sqrt{3}$.

3) $\triangle AOK \sim \triangle BCL$ по 2-му признаку ($\angle BOK = \angle BAC$ как сочл.). $k_1 = \frac{2}{3}$ 4) $\triangle B_1EL \sim \triangle B_1A_1C_1$ $k_2 = \frac{1}{2}$

5) из (3) и (4) $B_1O_1 = \frac{1}{3} B_1M$ $BO = \frac{2}{3} BF$

~~6) $O_1M = B_1M - B_1O_1 = B_1M - \frac{1}{3} B_1M = \frac{2}{3} B_1M = \frac{2}{3} BF$~~

7) $\angle O_1HM = \angle BOH$ по 2-му признаку сопоставления ($\angle MO_1H = \angle NOB$ как нал. $\angle O_1MB = \angle MBO$ как н.к. $O_1M = \frac{2}{3} B_1M = \frac{2}{3} BF = BO$)

Выводы:

1) $B_1M = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$ 2) $O_1M = \frac{2}{3} \cdot 3\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$

3) $O_1T \perp BF$ (BF н.) 4) $TO = \frac{1}{3} \cdot 3\sqrt{3} = \sqrt{3}$

5) по т. Пиф. $BM = \sqrt{9+27} = 6 \Rightarrow HM = BH = \frac{1}{2} \cdot BM = 3$.

6) $O_1O = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{3} \Rightarrow O_1H = HO = \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}\sqrt{3}$.

7) по теореме обратной теореме Пифагора н.к.


$O_1M^2 = O_1H^2 + HM^2 = 9+3 = 12$, то $\angle O_1HM = 90^\circ$ и $O_1H \perp MH$.

8) $MF \perp AL$ (т.к. призма правильная) и $MF \perp KO$ н.к.

$KO \parallel AL$ *

9) н.к. $EL \perp KO$, но $EL \parallel KO$ — наледие

10) XY — средняя линия пр. $EL \parallel KO$ и $O_1H = HO \Rightarrow HG \parallel YG$ плоскости ($EL \parallel KO$) 11) н.к. $\triangle KOL \sim \triangle YHG$ См. на обратном



2) $XY \parallel KP$ $MF \perp KO$ и $MF \perp B \cdot F$, ~~тогда $MF \perp XY$~~
~~тогда $XY \perp KO$~~ . тогда по признаку параллельности $XY \parallel KO$.
 $KO \perp (BFM) \Rightarrow$ ~~тогда~~ $KO \perp BM$.
 (BFM) не перпендикулярна $KO \Rightarrow BM \perp KO$ и
 $BM \perp XY$ $\Rightarrow (KO \perp XY) = \gamma$

3) m . к. $BM \perp XY$ и $BM \perp O_1O$, но по признаку параллельности $BM \perp (KO_1O)$ ~~и~~ $BM \perp \gamma$ \Rightarrow $m \perp \gamma$.

5) 1) $S_{\triangle EKO} = \frac{1}{2}(EL + KO) \cdot O_1O$

2) $EL = h_1 \cdot C_1 = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2$

3) $KO = AC = h_1 = 6 \cdot \frac{2}{3} = 4$

4) $S_{\triangle EKO} = \frac{1}{2}(2+4) \cdot 2\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$

5) $V_{\text{млеко}} = \frac{1}{3} S_{\text{осн.}} \cdot h = 6\sqrt{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot MH = 6\sqrt{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot 3 = 6\sqrt{3}$

Ответ: $6\sqrt{3}$. ~~кг/с.ег.~~

Комментарий.

Доказательство утверждения в пункте а содержит неточности. В решении пункта б обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 4.

Основанием четырёхугольной пирамиды $PABCD$ является трапеция $ABCD$, причём $\angle BAD + \angle ADC = 90^\circ$. Плоскости PAB и PCD перпендикулярны плоскости основания, K — точка пересечения прямых AB и CD .

а) Докажите, что плоскости PAB и PCD перпендикулярны.

б) Найдите объём пирамиды $KBCP$, если $AB = BC = CD = 4$, а высота пирамиды $PABCD$ равна 9.

Ответ: б) 12.

a) $\angle BAD + \angle ADC = 90^\circ \Rightarrow \angle DKB = 90^\circ$.

$\text{плоск.}(DkP) \perp \text{плоск.}(ADk) \Rightarrow AK \perp Dk$

$\Rightarrow AK \perp \text{плоск.} \text{ни.}(DPk)$

$AK \subset \text{ни.}(AKP) \Rightarrow \text{ни.}(AKP) \perp \text{ни.}(DPk)$

$\Rightarrow \text{плоскость } PAB \perp \text{ни.ти } PCD$.

б) $AB = BC = CD = 4$.

$AB = CD \Rightarrow \text{трапеция} - \text{равн. б.} \Rightarrow \angle KAD = \angle HDk \Rightarrow$

$\Rightarrow \angle KBC = \angle BCK \Rightarrow BK = CK = \frac{CB}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$.

$AK \perp \text{ни.}(DPk) \Rightarrow AK \perp PK$.

$\text{ни.}(AKP) \perp \text{ни.}(ADk) \Rightarrow PK \perp \text{ни.}(ADk)$

$AK \perp Dk \Rightarrow PK \perp \text{ни.}(APk) \Rightarrow PK \perp PK$

$AK \perp PK \Rightarrow PK \perp \text{ни.}(ADk) \Rightarrow PK - \text{высота}$.

$V(KBCP) = \frac{1}{3} \cdot PK \cdot \frac{1}{2} \cdot CK \cdot BK = \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} = 3 \cdot 4 = 12$.

Ответ: $V_{KBCP} = 12$.

Комментарий.

Утверждение в пункте а не доказано. В решении пункта б обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 5.

Основанием четырёхугольной пирамиды $PABCD$ является трапеция $ABCD$, причём $\angle BAD + \angle ADC = 90^\circ$. Плоскости PAB и PCD перпендикулярны плоскости основания, K — точка пересечения прямых AB и CD .

- а) Докажите, что плоскости PAB и PCD перпендикулярны.
б) Найдите объём пирамиды $KBCP$, если $AB = BC = CD = 4$, а высота пирамиды $PABCD$ равна 9.

Ответ: 6) 12.

14) Дано:

ПАДС - кр. паралл. $\angle BAC = 14^\circ$


АДС - трапеция ($AD \parallel BC$)

$\angle BAD + \angle ADC = 90^\circ$

$AB \cap CD = K$

а) Доказать: $PAB \perp PCD$

б) Найти: V_{PKPC} , если $AB = DC = CD = 4$, $PK = 9$



а) $\angle BKA = 180^\circ - (\angle BAC + \angle ACD) = 90^\circ$

Заметим, что $\angle BKA$ - прямой

угол звёздчатого угла между полосами PAB и PCD ,
 т.к. $DK \perp PK$ и $AK \perp PK$.

$\angle BKA = 90^\circ \Rightarrow PAB \perp PCD$, Ч.П.Д.

б) $AB = BC = CD = 4 \Rightarrow AD = 8$;

$S_{ADCD} = \frac{4+8}{2} \sqrt{12} = 12 \cdot \sqrt{3} = 12\sqrt{3}$

$\triangle ABC \approx \triangle BCD \Rightarrow \triangle KCB \sim \triangle KDA \Rightarrow \frac{S_{KCB}}{S_{KDA}} = \frac{S_{AKD}}{4} \Rightarrow$

$\Rightarrow S_{KDA} = \frac{4\sqrt{3}}{1} (12\sqrt{3} + S_{KCD}) \Rightarrow \frac{S_{KCD}}{4} = 3\sqrt{3} \Rightarrow S_{KCD} = 4\sqrt{3}$

$V_{PKPC} = \frac{1}{3} PK \cdot S_{KCD} = \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot 4\sqrt{3} = 3 \cdot 4\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$.

Ответ: $12\sqrt{3}$

Комментарий.

Утверждение в пункте *а* не доказано. В решении пункта *б* допущена ошибка и получен неверный ответ.


Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 6.

Основанием четырёхугольной пирамиды $PABCD$ является трапеция $ABCD$, причём $\angle BAD + \angle ADC = 90^\circ$. Плоскости PAB и PCD перпендикулярны плоскости основания, K — точка пересечения прямых AB и CD .

- а) Докажите, что плоскости PAB и PCD перпендикулярны.
б) Найдите объём пирамиды $KBCP$, если $AB = BC = CD = 4$, а высота пирамиды $PABCD$ равна 9.

Ответ: б) 12.



Комментарий.

Утверждение в пункте *а* не доказано. В решении пункта *б* обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 1 балл.

3. Критерии проверки и оценка решений задания 15 ЕГЭ–2018

Задание №15 – это неравенство – дробно-рациональное, логарифмическое или показательное.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением / включением граничных точек ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

При этом в первом случае выставления 1 балла допускаются только ошибки в строгости неравенства: «<» вместо «≤», или наоборот. **Если в ответ включено значение переменной, при котором одна из частей неравенства не имеет смысла, то следует выставлять оценку «0 баллов».**

Задача 15 (демонстрационный вариант 2018 г.).

Решите неравенство $\frac{9^x - 2 \cdot 3^{x+1} + 4}{3^x - 5} + \frac{2 \cdot 3^{x+1} - 51}{3^x - 9} \leq 3^x + 5$.

Решение.

Пусть $t = 3^x$, тогда неравенство примет вид:

$$\frac{t^2 - 6t + 4}{t-5} + \frac{6t - 51}{t-9} \leq t + 5; \frac{(t-1)(t-5)}{t-5} - \frac{1}{t-5} + \frac{6(t-9)}{t-9} + \frac{3}{t-9} \leq t + 5;$$

$$-\frac{1}{t-5} + \frac{3}{t-9} \leq 0; \frac{t-3}{(t-5)(t-9)} \leq 0,$$

откуда $t \leq 3$; $5 < t < 9$.

При $t \leq 3$ получим: $3^x \leq 3$, откуда $x \leq 1$.

При $5 < t < 9$ получим: $5 < 3^x < 9$, откуда $\log_3 5 < x < 2$.

Решение исходного неравенства:

$$x \leq 1; \log_3 5 < x < 2.$$

Ответ: $(-\infty; 1]; (\log_3 5; 2)$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки 1, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задача 1.

$$\text{Решите неравенство } 2^x - 6 - \frac{9 \cdot 2^x - 37}{4^x - 7 \cdot 2^x + 12} \leq \frac{1}{2^x - 4}.$$

Решение.

Пусть $t = 2^x$, тогда неравенство примет вид:

$$t - 6 - \frac{9t - 37}{t^2 - 7t + 12} \leq \frac{1}{t - 4}; t - 6 - \frac{9t - 37}{(t-3)(t-4)} - \frac{t-3}{(t-3)(t-4)} \leq 0;$$

$$t - 6 - \frac{10}{t-3} \leq 0, \text{ где } t \neq 4; \frac{(t-1)(t-8)}{t-3} \leq 0, \text{ где } t \neq 4,$$

откуда $t \leq 1; 3 < t < 4; 4 < t \leq 8$.

При $t \leq 1$ получим: $2^x \leq 1$, откуда $x \leq 0$.

При $3 < t < 4$ получим: $3 < 2^x < 4$, откуда $\log_2 3 < x < 2$.

При $4 < t \leq 8$ получим: $4 < 2^x \leq 8$, откуда $2 < x \leq 3$.

Решение исходного неравенства:

$$x \leq 0; \log_2 3 < x < 2; 2 < x \leq 3.$$

Ответ: $(-\infty; 0]; (\log_2 3; 2); (2; 3]$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точек 0 и/или 3, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задача 2.

Решите неравенство $\frac{\log_4(64x)}{\log_4 x - 3} + \frac{\log_4 x - 3}{\log_4(64x)} \geq \frac{\log_4 x^4 + 16}{\log_4^2 x - 9}$.

Решение.

Пусть $t = \log_4 x$, тогда неравенство примет вид:

$$\frac{t+3}{t-3} + \frac{t-3}{t+3} \geq \frac{4t+16}{t^2-9}; \quad \frac{t^2+6t+9}{(t-3)(t+3)} + \frac{t^2-6t+9}{(t-3)(t+3)} - \frac{4t+16}{(t-3)(t+3)} \geq 0;$$

$$\frac{2t^2-4t+2}{(t-3)(t+3)} \geq 0; \quad \frac{2(t-1)^2}{(t-3)(t+3)} \geq 0,$$

откуда $t < -3$; $t = 1$; $t > 3$.

При $t < -3$ получим: $\log_4 x < -3$, откуда $0 < x < \frac{1}{64}$.

При $t = 1$ получим: $\log_4 x = 1$, откуда $x = 4$.

При $t > 3$ получим: $\log_4 x > 3$, откуда $x > 64$.

Решение исходного неравенства: $0 < x < \frac{1}{64}$; $x = 4$; $x > 64$.

Ответ: $\left(0; \frac{1}{64}\right); 4; (64; +\infty)$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки 4, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Примеры оценивания решений задания 15

Пример 1.

Решите неравенство $2^x - 6 - \frac{9 \cdot 2^x - 37}{4^x - 7 \cdot 2^x + 12} \leq \frac{1}{2^x - 4}$.

Ответ: $(-\infty; 0] \cup (\log_2 3; 2) \cup (2; 3]$.

N15.

$$2^x - 6 - \frac{9 \cdot 2^x - 37}{4^x - 7 \cdot 2^x + 12} \leq \frac{1}{2^x - 4};$$

$$2^x = t;$$

$$t - 6 - \frac{9t - 37}{t^2 - 7t + 12} \leq \frac{1}{t - 4};$$

$$t - 6 - \frac{9t - 37}{(t-3)(t-4)} \leq \frac{1}{t-4};$$

$$t - 6 - \frac{9t - 37 + t - 3}{(t-3)(t-4)} \leq 0;$$

$$t - 6 - \frac{10(t-4)}{(t-3)(t-4)} \leq 0;$$

$$\frac{(t-9)(t-6)(t-3) - 10}{(t-3)(t-4)} \leq 0;$$

$$\frac{(t-9)(t-6)(t-3) - 10}{(t-3)(t-4)} \leq 0;$$

$$\frac{(t-9)(t-6)(t-8)}{(t-3)(t-4)} \leq 0;$$

$$0 < 2^x < 1 \quad 3 < 2^x < 4 \quad 4 < 2^x < 8$$

$$x \leq 0; \quad \begin{cases} x > \log_2 3; \\ x < 2; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 2; \\ x \leq 3; \end{cases}$$

Ответ: $(-\infty; 0] \cup (\log_2 3; 2) \cup (2; 3]$.

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 2.

Решите неравенство $2^x - 6 - \frac{9 \cdot 2^x - 37}{4^x - 7 \cdot 2^x + 12} \leq \frac{1}{2^x - 4}$.

Ответ: $(-\infty; 0] \cup (\log_2 3; 2) \cup (2; 3]$.

$$\begin{aligned}
 15) \quad & 2^x - 6 - \frac{9 \cdot 2^x - 37}{4^x - 7 \cdot 2^x + 12} \leq \frac{1}{2^x - 4} \\
 \text{Пусть } & 2^x = t \quad \text{тогда} \\
 & t - 6 - \frac{9t - 37}{(t-4)(t-3)} \leq \frac{1}{t-4} \quad \text{ОДЗ} \\
 & \frac{t^3 - 13t^2 + 54t - 72 - 9t + 37 - t + 3}{(t-4)(t-3)} \leq 0 \\
 & \frac{t^3 - 13t^2 + 44t - 32}{(t-4)(t-3)} \leq 0 \\
 & \frac{(t-4)(t^2 - 9t + 8)}{(t-4)(t-3)} \leq 0 \\
 & \frac{t^2 - 9t + 8}{t-3} \leq 0 \\
 \text{Обратимо} \\
 & \frac{(t-1)(t-8)}{t-3} \leq 0 \\
 \hline
 & \begin{array}{ccccccc} - & \bullet & + & 0 & - & \bullet & + \\ \hline & 0 & 1 & 3 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\
 \text{Ответ:} & (-\infty; 0] \cup (\log_2 3; 2) \cup (2; 3)
 \end{aligned}$$

Комментарий.

В решение содержится запись «ОДЗ», которая может трактоваться по-разному. Ответ получен неверный, но он отличается от верного только исключением точки 3.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 3.

Решите неравенство $2^x - 6 - \frac{9 \cdot 2^x - 37}{4^x - 7 \cdot 2^x + 12} \leq \frac{1}{2^x - 4}$.

Ответ: $(-\infty; 0] \cup (\log_2 3; 2) \cup (2; 3]$.

15. $2^x - 6 - \frac{9 \cdot 2^x - 37}{4^x - 7 \cdot 2^x + 12} \leq \frac{1}{2^x - 4}$

Пусть $t = 2^x$, то $t - 6 - \frac{9t - 37}{t^2 - 7t + 12} - \frac{1}{t-4} \leq 0$

$D = 95 - 9 \cdot 12 = 7$

$t_1 = \frac{7-1}{2} = 3$

$t_2 = \frac{7+1}{2} = 4$

$t_3 = \frac{7-3}{2} = 2$

$t_4 = \frac{7+3}{2} = 5$

$t_5 = \frac{7-5}{2} = 1$

$t_6 = \frac{7+5}{2} = 6$

$t_7 = \frac{7-7}{2} = 0$

$(t-1)(t-4)(t-6) - (9t-37) - (t-3) \leq 0$

$(t^3 - 13t^2 + 54t - 72) - (9t^2 - 37) - (t^2 - 3) \leq 0$

$t^3 - 13t^2 + 54t - 72 - 9t^2 + 37 - t^2 + 3 \leq 0$

$t^3 - 13t^2 + 54t - 32 \leq 0$

Схема Горнера: Пусть $t = 1$, то

$1 - 13 + 54 - 32 = 95 - 95 = 0$ — подходит

	1	-13	54	-32	
1	1	-12	32	0	

$(t-1)(t^2 - 12t + 32) \leq 0$

$t^2 - 12t + 32 = 0$

$D = 144 - 4 \cdot 32 = 144 - 128 = 16$

$t_1 = \frac{12-4}{2} = 4$

$t_2 = \frac{12+4}{2} = 8$

$t_3 = \frac{12-8}{2} = 2$

$t_4 = \frac{12+8}{2} = 10$

$x_1 = 0$

$x_2 = 2$

$x_3 = 4$

$x_4 = 8$

$x \in (-\infty; 0] \cup [2; 3] \cup [4; 8]$

Ответ: $(-\infty; 0] \cup [2; 3] \cup [4; 8]$

Комментарий.

При решении неравенства допущена ошибка — допущен неравносильный переход. Это привело к неверному ответу.

Оценка эксперта. 0 баллов.

Пример 4.

Решите неравенство $\frac{\log_4(64x)}{\log_4 x - 3} + \frac{\log_4 x - 3}{\log_4(64x)} \geq \frac{\log_4 x^4 + 16}{\log_4^2 x - 9}$.

Ответ: $\left(0; \frac{1}{64}\right) \cup \{4\} \cup (64; +\infty)$.

№15.

$$\frac{\log_4(64x)}{\log_4 x - 3} + \frac{\log_4 x - 3}{\log_4(64x)} \geq \frac{\log_4 x^4 + 16}{\log_4^2 x - 9}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log_4 x - 3 \neq 0 \\ \log_4(64x) \neq 0 \\ \log_4^2 x - 9 \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log_4 x \neq 3 \\ 64x \neq 1 \\ (\log_4 x - 3)(\log_4 x + 3) \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ x \neq 64 \\ x \neq \frac{1}{64} \\ \log_4 x \neq -3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ x \neq 64 \\ x \neq \frac{1}{64} \end{cases}$$

$$x \in (0; \frac{1}{64}) \cup (\frac{1}{64}; 64) \cup (64; +\infty)$$

$$\frac{\log_4 x + 3}{\log_4 x - 3} + \frac{\log_4 x - 3}{\log_4 x + 3} \geq \frac{4 \log_4 x + 16}{(\log_4 x - 3)(\log_4 x + 3)}$$

$$t = \log_4 x \quad t \neq \pm 3$$

$$\frac{t+3}{t-3} + \frac{t-3}{t+3} \geq \frac{4t+16}{(t-3)(t+3)}$$

$$\frac{(t+3)^2 + (t-3)^2 - 4t - 16}{(t-3)(t+3)} \geq 0$$

$$\frac{t^2 + 6t + 9 + t^2 - 6t + 9 - 4t - 16}{(t-3)(t+3)} \geq 0$$

$$\frac{2t^2 - 4t + 2}{(t-3)(t+3)} \geq 0 \quad \frac{t^2 - 2t + 1}{(t-3)(t+3)} \geq 0 \quad \frac{(t-1)^2}{(t+3)(t-3)} \geq 0 \quad \frac{t-1}{t+3} - \frac{1}{t-3} \geq 0$$

$$t \in (-\infty; -3) \cup \{1\} \cup (3; +\infty) \Rightarrow \log_4 x \in (-\infty; -3) \cup \{1\} \cup (3; +\infty) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x \in (0; \frac{1}{64}) \cup \{4\} \cup (64; +\infty)$$

$$\text{Ответ: } x \in (0; \frac{1}{64}) \cup \{4\} \cup (64; +\infty)$$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта. 2 балла.

Пример 5.

Решите неравенство $\frac{\log_4(64x)}{\log_4 x - 3} + \frac{\log_4 x - 3}{\log_4(64x)} \geq \frac{\log_4 x^4 + 16}{\log_4^2 x - 9}$.

Ответ: $\left(0; \frac{1}{64}\right) \cup \{4\} \cup (64; +\infty)$.

$$15. \frac{\log_4(64x)}{\log_4 x - 3} + \frac{\log_4 x - 3}{\log_4(64x)} \geq \frac{\log_4 x^4 + 16}{\log_4^2 x - 9}$$

ОДЗ. $x > 0$, $x \in (0; +\infty)$

$$\frac{\log_4 64 + \log_4 x}{\log_4 x - 3} + \frac{\log_4 x - 3}{\log_4 64 + \log_4 x} - \frac{4 \log_4 x + 16}{\log_4^2 x - 9} \geq 0$$

$$\frac{3 + \log_4 x}{\log_4 x - 3} + \frac{\log_4 x - 3}{3 + \log_4 x} - \frac{4 \log_4 x + 16}{\log_4^2 x - 9} \geq 0$$

Пусть $\log_4 x = t$, тогда


$$\frac{3+t}{t-3} + \frac{t-3}{3+t} - \frac{4t+16}{t^2-9} \geq 0$$

$$\frac{(t+3)(t+3) + (t-3)(t-3)}{(t-3)(t+3)} - \frac{4t+16}{(t-3)(t+3)} \geq 0$$

$$\frac{t^2+3t+3t+9+t^2-3t-3t+9-4t-16}{(t-3)(t+3)} \geq 0$$

$$\frac{2t^2-4t+2}{(t-3)(t+3)} \geq 0$$

$$\frac{2(t-1)^2}{(t-3)(t+3)} \geq 0$$



$$\log_4 x < -3$$

$$x < \frac{1}{64}$$

$$\log_4 x = 1$$

$$x = 4$$

$$\log_4 x > 3$$

$$x > 64$$

Ответ: $x \in (-\infty; \frac{1}{64}) \cup \{4\} \cup (64; +\infty)$

Комментарий.

При решении неравенства допущена ошибка при решении простейшего логарифмического неравенства. Ответ получен неверный. В решении содержится ошибочное утверждение, связанное с ОДЗ.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 6.

Решите неравенство $\frac{9^x - 2 \cdot 3^{x+1} + 4}{3^x - 5} + \frac{2 \cdot 3^{x+1} - 51}{3^x - 9} \leq 3^x + 5$.

Ответ: $(-\infty; 1] \cup (\log_3 5; 2)$.

$$\frac{9^x - 2 \cdot 3^{x+1} + 4}{3^x - 5} + \frac{2 \cdot 3^{x+1} - 51}{3^x - 9} \leq 3^x + 5$$

$$\frac{(3^{2x} - 2 \cdot 3^x + 4)(3^x - 5) + (2 \cdot 3^x - 51)(3^x - 5) - (3^x - 5)(3^x + 5)(3^x - 5)}{(3^x - 5)(3^x - 9)} \leq 0$$

$$\frac{3^{3x} - 6 \cdot 3^{2x} + 4 \cdot 3^x - 9 \cdot 3^{2x} + 54 \cdot 3^x - 36 + 6 \cdot 3^{2x} - 51 \cdot 3^x - 30 \cdot 3^x + 255 - (3^{2x} - 25)(3^x - 5)}{(3^x - 3^{\log_3 5})(3^x - 3^2)} \leq 0$$


знаки $(3^x - 3^{\log_3 5})$ и $(3^x - 3^2)$ совпадают со знаками $(x - \log_3 5)$ и $(x - 2)$
сомножителями

$$\frac{3^{3x} - 9 \cdot 3^{2x} - 23 \cdot 3^x + 219 - 3^{3x} + 8 \cdot 3^{2x} + 25 \cdot 3^x - 225}{(x - \log_3 5)(x - 2)} \leq 0$$

$$\frac{2 \cdot 3^x - 6}{(x - \log_3 5)(x - 2)} \leq 0 \quad ; \quad \frac{3^x - 3^1}{(x - \log_3 5)(x - 2)} \leq 0 \quad \text{знак } (3^x - 3^1) \text{ совпадает со знаками } (x - 1)$$

$$\frac{x - 1}{(x - \log_3 5)(x - 2)} \leq 0$$

$$1 < \log_3 5 < 2$$



$$\Rightarrow x \in \{-\infty; 1] \cup (\log_3 5; 2)$$

$$\text{Ответ: } \{-\infty; 1] \cup (\log_3 5; 2)$$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ. Левая круглая скобка в ответе может быть прочитана как фигурная, но это не является основанием для того, чтобы считать ответ неверным.

Оценка эксперта. 2 балла.

Пример 7.

Решите неравенство $\frac{9^x - 2 \cdot 3^{x+1} + 4}{3^x - 5} + \frac{2 \cdot 3^{x+1} - 51}{3^x - 9} \leq 3^x + 5$.

Ответ: $(-\infty; 1] \cup (\log_3 5; 2)$.

$$\frac{9^x - 2 \cdot 3^{x+1} + 4}{3^x - 5} + \frac{2 \cdot 3^{x+1} - 51}{3^x - 9} \leq 3^x + 5$$

$$\frac{3^x - 2 \cdot 3^{x+1} + 4}{3^x - 5} + \frac{2 \cdot 3^{x+1} - 51}{3^x - 9} \leq 3^x + 5$$

Пусть $3^x = t$

$$\frac{t^2 - 6t + 4}{t - 5} + \frac{6t - 51}{t - 9} \leq t + 5$$

$$\frac{(t^2 - 6t + 4) \cdot (t - 9) + (6t - 51)(t - 5)}{(t - 5)(t - 9)} \leq (t + 5)(t - 5)(t - 9)$$

$$t^3 - 6t^2 + 4t - 9t^2 + 54t - 36 + 6t^2 - 30t - 51t + 255 \leq t^3 - 25t - 9t^2 + 225$$

$$t^3 - 6t^2 + 4t - 9t^2 + 54t - 36 + 6t^2 - 30t - 51t + 255 - t^3 + 25t + 9t^2 - 225 \leq 0$$

$$2t - 6 = 0 \quad 3^x = 3$$

$$2t = 6 \quad x = 1$$

$$t = 3 \quad x \leq 1$$

$$3^x - 9 > 0 \quad 3^x - 5 > 0$$

$$3^x = 9 \quad 3^x = 5$$

$$x > 2 \quad x > \log_3 5$$

Ответ: $(-\infty; 1] \cup (\log_3 5; 2)$

Комментарий.

В решении допущены ошибочные утверждения, присутствует неравносильный переход при решении неравенств, получен ответ (совпадающий с верным).

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 8.

Решите неравенство $\frac{9^x - 2 \cdot 3^{x+1} + 4}{3^x - 5} + \frac{2 \cdot 3^{x+1} - 51}{3^x - 9} \leq 3^x + 5$.

Ответ: $(-\infty; 1] \cup (\log_3 5; 2)$.

$$\frac{9^x - 2 \cdot 3^{x+1} + 4}{3^x - 5} + \frac{2 \cdot 3^{x+1} - 51}{3^x - 9} \leq 3^x + 5$$

$$\frac{9^x - 2 \cdot 3^x \cdot 3 + 4}{3^x - 5} + \frac{2 \cdot 3 \cdot 3^x - 51}{3^x - 9} \leq 3^x + 5$$

$$3^x = t; t > 0$$

$$\frac{t^2 - 6t + 4}{t-5} + \frac{6t - 51}{t-9} - t - 5 \leq 0$$

$$\frac{(t^2 - 6t + 4)(t-9) + (6t - 51)(t-5) - (t+5)(t-5)(t-9)}{(t-5)(t-9)} \leq 0$$

$$\frac{2(t-18)}{(t-5)(t-9)} \leq 0$$

ОДЗ:

$3^x - 5 \neq 0$

$3^x - 9 \neq 0$

$x \neq 2$

$t \in (0; 5) \cup (9; 18]$
 $3^x \in (0; 5) \cup (9; 18]$
 $x \in (-\infty; \log_3 5) \cup (2; \log_3 18]$

Ответ: $x \in (-\infty; \log_3 5) \cup (2; \log_3 18]$

Комментарий.

Ответ неверный. При преобразовании числителя допущена вычислительная ошибка, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения.

Оценка эксперта: 1 балл.

4. Критерии проверки и оценка решений задания 16 ЕГЭ–2018

Задание №16 – это планиметрическая задача. В пункте *а* теперь нужно доказать геометрический факт, в пункте *б* – найти (вычислить) геометрическую величину.


Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта <i>a</i> и обоснованно получен верный ответ в пункте <i>b</i>	3
Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>b</i> ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта <i>a</i> и при обоснованном решении пункта <i>b</i> получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта <i>a</i> , ИЛИ при обоснованном решении пункта <i>b</i> получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте <i>b</i> с использованием утверждения пункта <i>a</i> , при этом пункт <i>a</i> не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	3

Задача 16 (демонстрационный вариант 2018 г.).

Две окружности касаются внешним образом в точке K . Прямая AB касается первой окружности в точке A , а второй — в точке B . Прямая BK пересекает первую окружность в точке D , прямая AK пересекает вторую окружность в точке C .

- а) Докажите, что прямые AD и BC параллельны.
б) Найдите площадь треугольника AKB , если известно, что радиусы окружностей равны 4 и 1.

Решение. а) Обозначим центры окружностей O_1 и O_2 соответственно. Пусть общая касательная, проведённая к окружностям в точке K , пересекает AB в точке M . По свойству касательных, проведённых из одной точки, $AM = KM$ и $KM = BM$. Треугольник AKB , у которого медиана равна половине стороны, к которой она проведена, прямоугольный.



Вписанный угол AKD прямой, поэтому он опирается на диаметр AD . Значит, $AD \perp AB$. Аналогично, получаем, что $BC \perp AB$. Следовательно, прямые AD и BC параллельны.

6) Пусть, для определённости, первая окружность имеет радиус 4, а вторая — радиус 1.

Треугольники BKC и AKD подобны, $\frac{AD}{BC} = 4$. Пусть $S_{BKC} = S$, тогда

$$S_{AKD} = 16S.$$

У треугольников AKD и AKB общая высота, следовательно, $\frac{S_{AKD}}{S_{AKB}} = \frac{DK}{KB} = \frac{AD}{BC}$,

то есть $S_{AKB} = 4S$. Аналогично, $S_{CKD} = 4S$. Площадь трапеции $ABCD$ равна $25S$. Вычислим площадь трапеции $ABCD$. Проведём к AD перпендикуляр O_2H , равный высоте трапеции, и найдём его из прямоугольного треугольника O_2HO_1 :

$$O_2H = \sqrt{O_1O_2^2 - O_1H^2} = 4.$$

Тогда

$$S_{ABCD} = \frac{AD + BC}{2} \cdot AB = 20.$$

Следовательно, $25S = 20$, откуда $S = 0,8$ и $S_{AKB} = 4S = 3,2$.

Ответ: 3,2.

Задача 1.

В трапеции $ABCD$ боковая сторона AB перпендикулярна основаниям. Из точки A на сторону CD опустили перпендикуляр AH . На стороне AB отмечена точка E так, что прямые CD и CE перпендикулярны.

- Докажите, что прямые BH и ED параллельны.
- Найдите отношение BH к ED , если $\angle BCD = 120^\circ$.

Решение.

а) Поскольку

$$\angle ABC = \angle AHC = \angle ECD = \angle EAD = 90^\circ,$$

около четырёхугольников $ABCH$ и $AECD$ можно описать окружности (рис. 1).

Значит,

$$\angle ABH = \angle ACH = \angle ACD = \angle AED,$$

то есть прямые BH и ED параллельны.

б) Опустим из точки B перпендикуляр BK на прямую CD (рис. 2). Стороны KH и CD треугольников BKH и ECD лежат на одной прямой, а стороны BK и EC , BH и ED попарно параллельны. Значит, треугольники BKH и ECD подобны.

Поскольку

$$\begin{aligned} BK &= BC \cdot \sin \angle BCK = EC \cdot \cos \angle ECB \cdot \sin \angle BCK = \\ &= EC \cdot \cos 30^\circ \cdot \sin 60^\circ = \frac{3}{4} EC, \end{aligned}$$

коэффициент подобия равен $\frac{3}{4}$. Значит,

$$BH : ED = 3 : 4.$$

Ответ: б) 3:4.




Рис. 1




Рис. 2

Задача 2.

В равнобедренном тупоугольном треугольнике ABC на продолжение боковой стороны BC опущена высота AH . Из точки H на сторону AB и основание AC опущены перпендикуляры HK и HM соответственно.

а) Докажите, что отрезки AM и MK равны.

б) Найдите MK , если $AB = 5$, $AC = 8$.

Решение.

а) Поскольку $\angle AMH = \angle AKH = 90^\circ$, можно описать окружность с диаметром AH . Получаем:

$\angle BAC = \angle BCA = 90^\circ - \angle HAC = \angle AHM$, поэтому $AM = MK$ как хорды, стягивающие равные дуги.


б) В прямоугольных треугольниках AHM и ACH имеем:

$$AM = AH \cdot \cos \angle HAM = AC \cdot \cos^2 \angle HAM = AC \cdot (1 - \cos^2 \angle ACB).$$

Поскольку $\cos \angle ACB = \frac{AC}{2BC} = \frac{4}{5}$, получаем:

$$MK = AM = \frac{72}{25}.$$

Ответ: б) $\frac{72}{25}$.



Примеры оценивания решений задания 16

Пример 1.

В трапеции $ABCD$ боковая сторона AB перпендикулярна основаниям. Из точки A на сторону CD опустили перпендикуляр AH . На стороне AB отмечена точка E так, что прямые CD и CE перпендикулярны.

- Докажите, что прямые BH и ED параллельны.
- Найдите отношение BH к ED , если $\angle BCD = 120^\circ$.

Ответ: б) 3:4.

<p>н16.</p> <p>Δано:</p> <p>$ABCD$ – трапеция</p> <p>$BC \perp AB \perp AD$</p> <p>$AH \perp CD$</p> <p>$CE \perp CD$</p> <p>а) Δоказатб:</p> <p>$BH \parallel ED$</p>	<p>Δоказательство:</p> <p>1) т.к. $AH \perp CD$ и $CE \perp CD$, то $AH \parallel CE$;</p> <p>2) AB – секущая при $AB \parallel$ прямых, значит $\angle BEC = \angle BAH$;</p> <p>3) BH – тоже секущая, значит $\angle BOE = \angle COH = \angle BHA$;</p> <p>4) ED – тоже секущая, значит $\angle CED = \angle EO_1A = \angle HO_1D$;</p> <p>5) $\angle EO_1H = 180^\circ - \angle COH$ (смеж. углы), $\angle EO_1H = 180^\circ - \angle BHA$. т.к. $\angle COH = \angle BHA$, то $\angle EO_1H = \angle EO_1A$, следовательно, EO_1HO_1 – параллелограмм, а его противолежащие стороны \parallel, значит, $BH \parallel ED$.</p>
---	---

Комментарий.

Имеется попытка доказательства утверждения пункта а). Логическая ошибка содержится в записи 5) – при вычислении угла EO_1H : $\angle EO_1H = 180^\circ - \angle EO_1A$. Замена угла $\angle EO_1A$ углом $\angle BHA$ возможна только при условии параллельности прямых BH и ED , а как раз это и требовалось доказать.



Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 2.

В трапеции $ABCD$ боковая сторона AB перпендикулярна основаниям. Из точки A на сторону CD опустили перпендикуляр AH . На стороне AB отмечена точка E так, что прямые CD и CE перпендикулярны.

- Докажите, что прямые BH и ED параллельны.
- Найдите отношение BH к ED , если $\angle BCD = 120^\circ$.

Ответ: б) 3:4.



Комментарий.

В данном решении есть попытка доказательства утверждения пункта *a*. Логическая ошибка содержится в записи $\angle KEM = \angle BMC$ – это возможно только при параллельности прямых BH и ED , а как раз это и требовалось доказать. Верный ответ в пункте *b* получен обоснованно с использованием недоказанного утверждения пункта *a*.


Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 3.

В трапеции $ABCD$ боковая сторона AB перпендикулярна основаниям. Из точки A на сторону CD опустили перпендикуляр AH . На стороне AB отмечена точка E так, что прямые CD и CE перпендикулярны.

- а) Докажите, что прямые BH и ED параллельны.
 б) Найдите отношение BH к ED , если $\angle BCD = 120^\circ$.

Ответ: б) 3:4.



Комментарий.

Логическая ошибка: доказательство утверждения пункта *a* опирается на дополнительное условие из пункта *b*.

Оценка эксперта: 0 баллов.

$\triangle KPA$, в свою очередь, подобен $\triangle AOM$ по третьему признаку подобия ($\angle APO = \angle KPO = \alpha$; $\angle PAK = \angle MAO = \alpha$; $\angle AOM = \angle APK = 90^\circ - \alpha$), следовательно стороны двух треугольников пропорциональны:

$$\frac{AO}{AP} = \frac{AM}{AK} = \frac{OM}{KP} \quad \text{и так как } PM = AM, \quad AP = 2AM, \\ \text{из подобия } \triangle KPA \text{ и } \triangle AOM \text{ равенство}$$

$$\cos \alpha = \frac{AR}{AC} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

Рассмотрим $\triangle PKM$, он - равнобедренный ($PM = KM$),
тогда $\angle KPM = \angle PKM = 80 - \alpha$.
Тогда $\angle PMK = 180 - 2(80 - \alpha) = 2\alpha$.

$$\cos \angle KPM = \cos (80 - \alpha) = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = \sin \alpha.$$

$$\sin \alpha = \frac{OP}{PR} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

Пусть $PM = AM = MK = x$

По теореме косинусов для $\triangle PKM$:

$$PK^2 = PM^2 + MK^2 - 2 \cdot PM \cdot MK \cdot \cos \angle KPM$$

$$PK^2 = 2x^2 - 2x^2 \cdot \sin \alpha$$

$$PK^2 = 2x^2 - 1,2x^2 = 0,8x^2$$

$$PK = \sqrt{0,8x^2} = \frac{2x\sqrt{2}}{\sqrt{10}} = 2x\sqrt{\frac{1}{5}} = \frac{2x\sqrt{5}}{5}$$

По теореме Пифагора для $\triangle APK$:

$$AK^2 = AP^2 - PK^2$$

$$16 - 16x + 4x^2 = \frac{20x^2}{25} + \frac{8}{25} - \frac{80x^2}{25}$$

$$AK^2 = 4x^2 - 0,8x^2 = 3,2x^2$$

$$16 - 16x + 4x^2 = \frac{125 - 60x^2}{25}$$

$$AK = x\sqrt{\frac{32}{25}} = 4x\sqrt{\frac{1}{5}} = \frac{4x\sqrt{5}}{5}$$

$$16 - 16x + 4x^2 = \frac{25 - 12x^2}{5}$$

$$\frac{AK}{PK} = \frac{\frac{4x\sqrt{5}}{5}}{\frac{2x\sqrt{5}}{5}} = 2, \quad \cancel{\text{так как } x \neq 0}, \quad \cancel{PK = 5 - AK}$$

$$80 - 80x + 20x^2 = 25 - 12x^2$$

$$8x^2 - 80x + 65 = 0$$

$$D = 6400 - 2080 = 4320$$

$$x = \frac{\sqrt{4320} \pm 20}{16} = \frac{12\sqrt{30}}{16} \pm 5 =$$

$$= \frac{3\sqrt{30} + 20}{4} = MK;$$

По теореме Пифагора для $\triangle BKP$:

$$BP^2 = BK^2 + KP^2$$

$$16 - 16x + 4x^2 = BK^2 + KP^2$$

$$16 - 16x + 4x^2 = \frac{20x^2}{25} + \left(5 - \left(4x^2 + \frac{20x^2}{25} \right) \right)$$

$$\text{Ответ: } \frac{3\sqrt{30} + 20}{4};$$

Комментарий.

Доказательство утверждения пункта а верно. Правда, следует отметить, что в доказательстве получено много верных утверждений, которые не нужны для доказательства равенства отрезков AM и MK , кроме того некорректно формулируется признак подобия треугольников.

В решении пункта б допущена ошибка при вычислении длины отрезка PK – вместо $\cos \angle KPM$ должно быть $\cos \angle KMP$.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 5.

В равнобедренном тупоугольнике ABC на продолжение боковой стороны BC опущена высота AH . Из точки H на сторону AB и основание AC опущены перпендикуляры HK и HM соответственно.

а) Докажите, что отрезки AM и MK равны.

б) Найдите MK , если $AB = 5$, $AC = 8$.

Ответ: б) $\frac{72}{25}$.

16.

Дано: $AB = BC$, $\triangle ABC$
 $AB = 5$
 $BC = 8$
 $HK \perp AB$
 $HM \perp AC$
 $MK - ?$

$AN = CN$

$AM = \frac{1}{2} AC = \frac{8}{2} = 4$

$\cos A = 0,8 = \frac{AN}{AB} = \frac{4}{5}$

$\frac{AM}{AH} = \frac{4}{5}$ $\cos A = \cos C = 0,8$ $\triangle ABC$

$\frac{AM}{5} = \frac{4}{5}$ $\frac{hC}{AC} = \frac{4}{5}$

$\frac{hC}{8} = \frac{4}{5}$

$5hC = 32$ $\frac{Ah}{AC} = \frac{3}{5}$ $Ah = 4 \cdot 8$
 $hC = 6,4$

$\sin^2 C = 1 - \cos^2 C = 1 - 0,64 = 0,36$
 $\sin C = 0,6$

$\sin C = \cos A = 0,8$ $\triangle ACh$

$\frac{AM}{Ah} = \frac{0,6}{0,8} = \frac{3}{4}$ $\frac{AM}{Ah} = 0,6$

$AM = 0,6 \cdot 4,8$
 $AM = 2,88$
 $AM = MK = 2,88$

Ответ: $MK = 2,88$

Комментарий.

Доказательство утверждения пункта а) отсутствует. Решение пункта б) выполнено верно с использованием недоказанного утверждения пункта а).

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 6.

В равнобедренном тупоугольном треугольнике ABC на продолжение боковой стороны BC опущена высота AH . Из точки H на сторону AB и основание AC опущены перпендикуляры HK и HM соответственно.

а) Докажите, что отрезки AM и MK равны.

б) Найдите MK , если $AB = 5$, $AC = 8$.

Ответ: б) $\frac{72}{25}$.

(16)

а) $\triangle ABE$: $p(O) \Rightarrow \angle BAE = \angle BCA$ (1)
 $\triangle AHK$: прямой \angle КН высота \angle
 $\triangle ACK \sim \triangle AHK \Rightarrow \angle ACK = \angle AHK$ (2)
 $\triangle AOM \sim \triangle OHK$ (у. \angle) $\Rightarrow \angle OAM = \angle OHK$ (3)
(1), (2), (3) \Rightarrow ОК - бисс $\angle AHB$.
~~помощь~~ \Rightarrow биссектриса $\angle AHB$.
~~помощь~~ \Rightarrow биссектриса $\angle AHB$. $\triangle AHD$:

HM - бисс $\angle AHB$ $\Rightarrow \triangle AHD$: $p(O) \Rightarrow HM$ - бисс $\angle AHB$ $\Rightarrow AM = MD$
 $\triangle AHD$: прямой \angle $AM = MD \Rightarrow KM$ - бисс $\angle AHB$ $\Rightarrow KM = AD$.
 $2KM = 2AD \Rightarrow KM = AM$ к. г. д.

б) пусть $HB = x$ ~~$\triangle AHB$: прямой \angle~~ $\Rightarrow \triangle AHB$: прямой \angle $AK^2 = AB^2 - KB^2$
 $\triangle AHK$: прямой \angle $AK^2 = AC^2 - KC^2 \Rightarrow AB^2 - KB^2 = AC^2 - KC^2$
 $25 - x^2 = 64 - CB^2 - 2KB \cdot CB - KB^2 \Rightarrow KB = 1,4$
 $\triangle AKE$: $KC^2 = ME \cdot AC$ $(6,4)^2 = 8 \cdot CM \Rightarrow CM = 5,12$
 $AM = AC - ME = 8 - 5,12 = 2,88$ $\Rightarrow MK = 2,88$

Ответ: б) $MK = 2,88$

Комментарий.

В доказательстве утверждения пункта *а* есть некорректное утверждение – « KM – биссектриса», при этом тут же записаны утверждения, соответствующие медиане прямоугольного треугольника.

Решение пункта *б* выполнено верно.

Оценка эксперта: 3 балла.

5. Критерии проверки и оценка решений задания 17 ЕГЭ–2018

Задание №17 – это текстовая задача с экономическим содержанием.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	3
Верно построена математическая модель, решение сведено к исследованию этой модели и получен результат: — неверный ответ из-за вычислительной ошибки; — верный ответ, но решение недостаточно обосновано	2
Верно построена математическая модель, решение сведено к исследованию этой модели, при этом решение может быть не завершено	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	3

Несколько подробнее: 1 балл можно выставлять в тех случаях, когда сюжетное условие задачи верно сведено к решению математической (арифметической, алгебраической, функциональной, геометрической) задачи. Именно к решению, а не к отдельному равенству, набору уравнений, уравнению, задающему функцию и т.п. Грубо говоря, предъявленный текст должен включать направление, «продолжаемое» до верного решения. Оценка в 2 балла, разумеется, включает в себя условие выставления 1 балла, но существенно ближе к верному решению задачи.

Здесь предполагается завершенное, практически полное решение соответствующей математической задачи. Типичные допустимые погрешности здесь – вычислительные ошибки (при наличии всех шагов решения) или недостаточно полные обоснования.

Отметим, что термин «математическая модель», быть может, излишне высокопарен для сравнительно простых задач экономического содержания, предлагаемых на ЕГЭ. Однако, по нашему мнению, он наиболее лаконичен, общеупотребим и достаточно ясен для того, чтобы пытаться отыскать ему адекватную замену. Следует подчеркнуть, что один и тот же сюжет может быть успешно сведен к различным математическим моделям и доведён до верного ответа. По этой причине в критериях проверки нигде нет жесткого упоминания о какой-либо конкретной (арифметической, алгебраической, геометрической, функциональной) модели.

Вообще, способов верного решения заданий этого типа никак не меньше, чем для привычных текстовых задач. Возможен и стиль, приближенный к высшей математике, и наивный подход, напоминающий арифметический способ решения текстовых задач, и метод использующий специфические для математической экономики понятия (целевая функция, симплекс-метод и т.п.).

Задача 17 (демонстрационный вариант 2018 г.).

15-го января планируется взять кредит в банке на шесть месяцев в размере 1 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на r процентов по сравнению с концом предыдущего месяца, где r — целое число;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в соответствии со следующей таблицей.

Дата	15.01	15.02	15.03	15.04	15.05	15.06	15.07
Долг (в млн рублей)	1	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0

Найдите наибольшее значение r , при котором общая сумма выплат будет меньше 1,2 млн рублей.

Решение. По условию, долг перед банком (в млн рублей) на 15-е число каждого месяца должен уменьшаться до нуля следующим образом:

$$1; 0,6; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0.$$

Пусть $k = 1 + \frac{r}{100}$, тогда долг на 1-е число каждого месяца равен:

$$k; 0,6k; 0,4k; 0,3k; 0,2k; 0,1k.$$

Следовательно, выплаты со 2-го по 14-е число каждого месяца составляют:

$$k - 0,6; 0,6k - 0,4; 0,4k - 0,3; 0,3k - 0,2; 0,2k - 0,1; 0,1k.$$

Общая сумма выплат составляет:

$$\begin{aligned} k(1 + 0,6 + 0,4 + 0,3 + 0,2 + 0,1) - (0,6 + 0,4 + 0,3 + 0,2 + 0,1) = \\ = (k-1)(1 + 0,6 + 0,4 + 0,3 + 0,2 + 0,1) + 1 = 2,6(k-1) + 1. \end{aligned}$$

По условию, общая сумма выплат будет меньше 1,2 млн рублей, значит,

$$2,6(k-1) + 1 < 1,2; 2,6 \cdot \frac{r}{100} + 1 < 1,2; r < 7 \frac{9}{13}.$$

Наибольшее целое решение этого неравенства — число 7. Значит, искомое число процентов — 7.

Ответ: 7.

Задача 1.

15-го января планируется взять кредит в банке на шесть месяцев в размере 1 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на r процентов по сравнению с концом предыдущего месяца, где r — целое число;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в соответствии со следующей таблицей.

Дата	15.01	15.02	15.03	15.04	15.05	15.06	15.07
Долг (в млн рублей)	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0

Найдите наименьшее значение r , при котором общая сумма выплат будет больше 1,2 млн рублей.

Решение.

По условию, долг перед банком (в млн рублей) на 15-е число каждого месяца должен уменьшаться до нуля следующим образом:

$$1; 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0.$$

Пусть $k = 1 + \frac{r}{100}$, тогда долг на 1-е число каждого месяца равен:

$$k; 0,9k; 0,8k; 0,7k; 0,6k; 0,5k.$$

Следовательно, выплаты со 2-го по 14-е число каждого месяца составляют:

$$k - 0,9; 0,9k - 0,8; 0,8k - 0,7; 0,7k - 0,6; 0,6k - 0,5; 0,5k.$$

Общая сумма выплат составляет:

$$\begin{aligned} k(1 + 0,9 + 0,8 + 0,7 + 0,6 + 0,5) - (0,9 + 0,8 + 0,7 + 0,6 + 0,5) = \\ = (k-1)(1 + 0,9 + 0,8 + 0,7 + 0,6 + 0,5) + 1 = 4,5(k-1) + 1. \end{aligned}$$

По условию, общая сумма выплат будет больше 1,2 млн рублей, значит,

$$4,5(k-1) + 1 > 1,2; 4,5 \cdot \frac{r}{100} + 1 > 1,2; r > 4\frac{4}{9}.$$

Наименьшее целое решение этого неравенства — число 5. Значит, искомое число процентов — 5.

Ответ: 5.

Задача 2.

В июле 2020 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Если ежегодно выплачивать по 58 564 рубля, то кредит будет полностью погашен за 4 года, а если ежегодно выплачивать по 106 964 рубля, то кредит будет полностью погашен за 2 года. Найдите r .

Решение.

Пусть сумма кредита составляет S рублей, а ежегодные выплаты X рублей, $k = 1 + \frac{r}{100}$. По условию, долг перед банком (в рублях) по состоянию на июль должен уменьшаться следующим образом:

$S, kS - X, k^2S - kX - X, k^3S - k^2X - kX - X, k^4S - k^3X - k^2X - kX - X$. Таким образом, если долг будет выплачен двумя равными платежами X_2 , то

$$X_2 = \frac{k^2 \cdot (k-1)}{k^2 - 1} \cdot S = 106964.$$

Если долг будет выплачен четырьмя равными платежами X_4 , то

$$X_4 = \frac{k^4 \cdot (k-1)}{k^4 - 1} \cdot S = 58564.$$

Таким образом, $\frac{X_4}{X_2} = \frac{k^2}{k^2 + 1} = \frac{58564}{106964} = \frac{121}{221}$, откуда $k^2 = \frac{121}{100}$; $k = 1,1$. Значит, $r = 10$.

Ответ: 10.

Примеры оценивания решений задания 17

Пример 1.

15-го января планируется взять кредит в банке на шесть месяцев в размере 1 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на r процентов по сравнению с концом предыдущего месяца, где r — целое число;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в соответствии со следующей таблицей.

Дата	15.01	15.02	15.03	15.04	15.05	15.06	15.07
Долг (в млн рублей)	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0

Найдите наименьшее значение r , при котором общая сумма выплат будет больше 1,2 млн рублей.

Ответ: 5.

месяц	сумма долга 1-го числа (млн р)	сумма долга 15-го числа	сумма выплат
1		1 млн	
2	$1 + 1 \cdot r$	0,9	$1 + 1 \cdot r - 0,9$
3	$0,9 + 0,9 \cdot r$	0,8	$0,9 + 0,9 \cdot r - 0,8$
4	$0,8 + 0,8 \cdot r$	0,7	$0,8 + 0,8 \cdot r - 0,7$
5	$0,7 + 0,7 \cdot r$	0,6	$0,7 + 0,7 \cdot r - 0,6$
6	$0,6 + 0,6 \cdot r$	0,5	$0,6 + 0,6 \cdot r - 0,5$
7	$0,5 + 0,5 \cdot r$	0	$0,5 + 0,5 \cdot r$

тогда общая сумма выплат:

$$1 + 1 \cdot r - 0,9 + 0,9 + 0,9 \cdot r - 0,8 + 0,8 + 0,8 \cdot r - 0,7 + 0,7 + 0,7 \cdot r - 0,6 + 0,6 + 0,6 \cdot r - 0,5 + 0,5 + 0,5 \cdot r = 1 + r + 0,9r + 0,8r + 0,7r + 0,6r + 0,5r = 1 + 4,5r$$

общая сумма выплат должна быть больше 1,2 млн \Rightarrow

$$1 + 4,5r > 1,2 \\ 4,5r > 0,2 \\ r > 2,25$$

т.к. r — целое число, то
наименьшее $r = 3$.

Ответ: r наименьшим = 3

Комментарий.

Модель построена неверно. Если подставить вместо r число 3 в таблицу, то сумма долга уже на 1 число второго месяца должна составить 4 млн рублей, кроме того, еще и неравенство решено неверно.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 2.

15-го января планируется взять кредит в банке на шесть месяцев в размере 1 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на r процентов по сравнению с концом предыдущего месяца, где r — целое число;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в соответствии со следующей таблицей.

Дата	15.01	15.02	15.03	15.04	15.05	15.06	15.07
Долг (в млн рублей)	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0

Найдите наименьшее значение r , при котором общая сумма выплат будет больше 1,2 млн рублей.

Ответ: 5.

17) Всего было 6 платежей: $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$.	$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 \geq 1,2$	$P_1 = (1 + \frac{r}{100}) - 0,9$
	$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 = S$	$P_2 = 0,9(1 + \frac{r}{100}) - 0,8$
r	P_1	P_2
7	0,92	0,849
6	0,912	0,816
5	0,906	0,796
4	0,901	0,779
3	0,896	0,763
2	0,891	0,749
1	0,886	0,736
	P_3	P_4
7	0,881	0,722
6	0,876	0,709
5	0,871	0,697
4	0,866	0,685
3	0,861	0,674
2	0,856	0,663
1	0,851	0,652
	P_5	P_6
7	0,846	0,642
6	0,841	0,632
5	0,836	0,622
4	0,831	0,612
3	0,826	0,602
2	0,821	0,592
1	0,816	0,582
	S	
7	0,811	0,572
6	0,806	0,562
5	0,801	0,552
4	0,796	0,542
3	0,791	0,532
2	0,786	0,522
1	0,781	0,512
		$P = 0,5(1 + \frac{r}{100})$
		Найменьшее значение, при котором $S > 1,2$
		является 5. При $r = 4, S < 1,2$.
		Ответ: 5

Комментарий.

Модель построена верно. Усложняет проверку отсутствие вычислений. В таблице все результаты вычислений по формулам, записанным справа, верные. Логика решения верна.

Оценка эксперта: 3 балла.

Пример 3.

15-го января был выдан полугодовой кредит на развитие бизнеса. В таблице 15-го января планируется взять кредит в банке на шесть месяцев в размере 1 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на r процентов по сравнению с концом предыдущего месяца, где r — целое число;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в соответствии со следующей таблицей.

Дата	15.01	15.02	15.03	15.04	15.05	15.06	15.07
Долг (в млн рублей)	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0

Найдите наименьшее значение r , при котором общая сумма выплат будет больше 1,2 млн рублей.

Ответ: 5.

Дано:
 $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6 \geq 1,2$ млн , где X — выплата

$N = 1$ — сумма кредита

$r_{\min} = ?$, где $r = \%$ $r \in \mathbb{Z}$

$X_1 = N + \frac{rN}{100} - 0,9 ; X_2 = 0,9 + \frac{r \cdot 0,9}{100} - 0,8 ; X_3 = 0,8 + \frac{r \cdot 0,8}{100} - 0,7 ;$
 $X_4 = 0,7 + \frac{r \cdot 0,7}{100} - 0,6 ; X_5 = 0,6 + \frac{r \cdot 0,6}{100} - 0,5 ; X_6 = 0,5 + \frac{r \cdot 0,5}{100}$
 $1 + \frac{r}{100} - 0,9 + 0,9 + \frac{r \cdot 0,9}{100} - 0,8 + 0,8 + \frac{r \cdot 0,8}{100} - 0,7 + 0,7 + \frac{r \cdot 0,7}{100} - 0,6 + 0,6 + \frac{r \cdot 0,6}{100} - 0,5 + 0,5 + \frac{r \cdot 0,5}{100} \geq 1,2$

$1 + \frac{3,5r}{100} \geq 1,2 \quad r > \frac{20}{3,5} \quad \text{Ответ: } r = 5\%$

$\frac{3,5r}{100} > 0,2 \quad r_{\min} = 5\%$

Комментарий.

Почти правильное решение, содержащее ошибки (вычислительного характера). Две ошибки: 1) $1 + \frac{4,5r}{100} > 1,2$, а не $1 + \frac{3,5r}{100} > 1,2$; 2) $\frac{20}{3,5} > 5,7$, т.е. должно быть $r = 6$ — не позволяют выставить 2 балла.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 4.

В июле 2020 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:

— каждый январь долг увеличивается на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;

— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Если ежегодно выплачивать по 58 564 рубля, то кредит будет полностью погашен за 4 года, а если ежегодно выплачивать по 106 964 рубля, то кредит будет полностью погашен за 2 года. Найдите r .

Ответ: 10.

17. Годы	$(1 + \frac{r}{100})^x = x$	
январь 2021	$5x$	1) способ
июнь 2021	$5x - 58564$	$5x$
январь 2022	$5x^2 - 58564x$	$5x - 106964$
июнь 2022	$5x^2 - 58564x - 58564$	$5x^2 - 106964x$
январь 2023	$5x^3 - 58564x^2 - 58564x$	$5x^2 - 106964x - 106964$
июнь 2023	$5x^3 - 58564x^2 - 58564x - 58564$	0
январь 2024	$5x^4 - 58564x^3 - 58564x^2 - 58564x$	0
июнь 2024	$5x^4 - 58564x^3 - 58564x^2 - 58564x - 58564$	0

$$\begin{cases} 5x^3 - 106964x - 106964 = 0 \\ 5x^4 - 58564x^3 - 58564x^2 - 58564x - 58564 = 0 \end{cases}$$

$$1) S = \frac{106964}{x} + \frac{106964}{x^2}$$

$$2) S = \frac{58564}{x} + \frac{58564}{x^2} + \frac{58564}{x^3} + \frac{58564}{x^4}$$

$$\frac{106964}{x} + \frac{106964}{x^2} = \frac{58564}{x} + \frac{58564}{x^2} + \frac{58564}{x^3} + \frac{58564}{x^4}$$

$$\frac{49400}{x} + \frac{49400}{x^2} - \frac{58564}{x^3} - \frac{58564}{x^4} = 0 \quad / \cdot x^4$$

$$49400x^3 + 49400x^2 - 58564x - 58564 = 0$$

$$49400x^2(x+1) - 58564(x+1) = 0$$

$$(x+1)(49400x^2 - 58564) = 0$$

$$x = -1, \text{ не подходит. Но } x = 1.$$

$$49400x^2 = 58564$$

$$x = \frac{29}{100}$$

$$\text{НДС 3: } \frac{(1+r)}{100} = \frac{29}{100}$$

$$r = 10$$

Ответ: 10%.

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 3 балла.

Пример 5.

В июле 2020 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Если ежегодно выплачивать по 58 564 рубля, то кредит будет полностью погашен за 4 года, а если ежегодно выплачивать по 106 964 рубля, то кредит будет полностью погашен за 2 года. Найдите r .

Ответ: 10.

S - сумма взятого кредита ^{N77}
 r - коэффициент боякращения.

$$k = 1 + \frac{r}{100} \quad k > 0$$
$$\left(\left(S + \frac{Sr}{100} \right) - 58564 \right) \left(1 + \frac{r}{100} \right) - 58564 \left(1 + \frac{r}{100} \right)^2 - 58564 \left(1 + \frac{r}{100} \right)^3 - 58564 = 0$$
$$\left(\left(S k - 58564 \right) k - 58564 \right) k - 58564 = 0$$
$$(Sk - 106964) k - 106964 = 0$$
$$12100k^3 + 12100k^2 - 14641k - 14641 = 0$$
$$12100k^2(k+1) - 14641k(k+1) = 0$$
$$(12100k^2 - 14641)(k+1) = 0$$
$$k^2 = \frac{14641}{12100}, \quad k = \frac{\sqrt{14641}}{110}$$
$$1 + \frac{r}{100} = \frac{\sqrt{14641}}{110}$$
$$r = \left(\frac{\sqrt{14641}}{110} - 1 \right) 100 = \frac{100\sqrt{14641}}{110} - 100$$

Ответ: $\frac{100\sqrt{14641}}{110} - 100$

Комментарий.

В решении без объяснений записаны уравнения. Переход от системы к уравнению относительно k не объяснен. Числовой ответ явно не получен: не извлечен корень из числа 14641. Таким образом, решение недостаточно обоснованное.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 6.

15-го января был выдан полугодовой кредит на развитие бизнеса. В таблице 15-го января планируется взять кредит в банке на шесть месяцев в размере 1 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на r процентов по сравнению с концом предыдущего месяца, где r — **целое** число;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в соответствии со следующей таблицей.

Дата	15.01	15.02	15.03	15.04	15.05	15.06	15.07
Долг (в млн рублей)	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0

Найдите наименьшее значение r , при котором общая сумма выплат будет больше 1,2 млн рублей.

Ответ: 5.

$$\begin{aligned}
 & 1 + \frac{r}{100}, 1 + \frac{r}{100} > 1,2 \\
 & 1 + \frac{6r}{100} > 1,2 \\
 & \frac{6r}{100} > 0,2 \\
 & \frac{r}{100} > \frac{1}{30} \quad \text{близайшее целое 4 и 5} \\
 & \frac{r}{100} > \frac{1}{30} \quad \text{не подходит, берём на 1 больше.} \\
 & \frac{5}{100} = \frac{1}{20} > \frac{1}{30} \\
 & \frac{90}{1800} > \frac{80}{1800} \Rightarrow \text{Ответ. } r = 5
 \end{aligned}$$

Комментарий.

В решении без объяснений записано неравенство. Неравенство явно не решено. Таким образом, решение недостаточно обоснованное.

Оценка эксперта: 2 балла.

6. Критерии проверки и оценка решений задания 18 ЕГЭ–2018

Задание №18 – это уравнение, неравенство или их системы с параметром.

Задачи с параметром допускают весьма разнообразные способы решения.

Наиболее распространенными из них являются:

- чисто алгебраический способ решения;
 - способ решения, основанный на построении и исследовании геометрической модели данной задачи;
 - функциональный способ, в котором могут быть и алгебраические, и геометрические моменты, но базовым является исследование некоторой функции.

Зачастую (но далеко не всегда) графический метод более ясно ведёт к цели. Кроме того, в конкретном тексте решения вполне могут встречаться элементы каждого из трех перечисленных способов.

Задача 18 (демонстрационный вариант 2018 г.).


Найдите все положительные значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} (|x|-5)^2 + (y-4)^2 = 9, \\ (x+2)^2 + y^2 = a^2 \end{cases}$$

имеет единственное решение.

Решение. Если $x \geq 0$, то уравнение $(|x| - 5)^2 + (y - 4)^2 = 9$ задаёт окружность ω_1 с центром в точке $C_1(5; 4)$ радиусом 3, а если $x < 0$, то оно задаёт окружность ω_2 с центром в точке $C_2(-5; 4)$ таким же радиусом (см. рисунок).

При положительных значениях a уравнение $(x+2)^2 + y^2 = a^2$ задаёт окружность ω с центром в точке $C(-2; 0)$ радиусом a . Поэтому задача состоит в том, чтобы найти все значения a , при каждом из которых окружность ω имеет единственную общую точку с объединением окружностей ω_1 и ω_2 .



Из точки C проведём луч CC_1 и обозначим через A_1 и B_1 точки его пересечения с окружностью ω_1 , где A_1 лежит между C и C_1 . Так как $CC_1 = \sqrt{(5+2)^2 + 4^2} = \sqrt{65}$, то $CA_1 = \sqrt{65} - 3$, $CB_1 = \sqrt{65} + 3$.

При $a < CA_1$ или $a > CB_1$ окружности ω и ω_1 не пересекаются.

При $CA_1 < a < CB_1$ окружности ω и ω_1 имеют две общие точки.

При $a = CA_1$ или $a = CB_1$ окружности ω и ω_1 касаются.

Из точки C проведём луч CC_2 и обозначим через A_2 и B_2 точки его пересечения с окружностью ω_2 , где A_2 лежит между C и C_2 . Так как $CC_2 = \sqrt{(-5+2)^2 + 4^2} = 5$, то $CA_2 = 5 - 3 = 2$, $CB_2 = 5 + 3 = 8$.

При $a < CA_2$ или $a > CB_2$ окружности ω и ω_2 не пересекаются.

При $CA_2 < a < CB_2$ окружности ω и ω_2 имеют две общие точки.

При $a = CA_2$ или $a = CB_2$ окружности ω и ω_2 касаются.

Исходная система имеет единственное решение тогда и только тогда, когда окружность ω касается ровно одной из двух окружностей ω_1 и ω_2 и не пересекается с другой. Так как $CA_2 < CA_1 < CB_2 < CB_1$, то условию задачи удовлетворяют только числа $a = 2$ и $a = \sqrt{65} + 3$.

Ответ: 2; $\sqrt{65} + 3$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получены оба верных значения параметра, но <ul style="list-style-type: none"> – или в ответ включены также и одно-два неверных значения; – или решение недостаточно обосновано 	3
С помощью верного рассуждения получено хотя бы одно верное значение параметра	2
Задача сведена к исследованию: <ul style="list-style-type: none"> – или взаимного расположения трёх окружностей; – или двух квадратных уравнений с параметром 	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Задача 1

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{3x^2 + 2ax + 1} = x^2 + ax + 1 \text{ имеет ровно три различных корня.}$$

Решение.

Исходное уравнение равносильно уравнению $3x^2 + 2ax + 1 = (x^2 + ax + 1)^2$ при условии $x^2 + ax + 1 \geq 0$.

Решим уравнение $3x^2 + 2ax + 1 = (x^2 + ax + 1)^2$:

$$3x^2 + 2ax + 1 = x^4 + 2ax^3 + (a^2 + 2)x^2 + 2ax + 1;$$

$$x^4 + 2ax^3 + (a^2 - 1)x^2 = 0; x^2(x + a + 1)(x + a - 1) = 0,$$

откуда $x = 0$, $x = 1 - a$ или $x = -1 - a$.

Исходное уравнение имеет три корня, когда эти числа различны и для каждого из них выполнено условие $x^2 + ax + 1 \geq 0$.

Рассмотрим условия совпадения корней. При $a = 1$ имеем $1 - a = 0$.

При $a = -1$ имеем $-1 - a = 0$. При остальных значениях a числа 0 , $1 - a$, $-1 - a$ различны.

При $x = 0$ получаем: $x^2 + ax + 1 = 1 \geq 0$ при всех значениях a .

При $x = 1 - a$ получаем:

$$x^2 + ax + 1 = (1 - a)^2 + a(1 - a) + 1 = 2 - a.$$

Это выражение неотрицательно при $a \leq 2$.

При $x = -1 - a$ получаем:

$$x^2 + ax + 1 = (-1 - a)^2 + a(-1 - a) + 1 = a + 2.$$

Это выражение неотрицательно при $a \geq -2$.

Таким образом, исходное уравнение имеет ровно три различных корня при

$$-2 \leq a < -1; -1 < a < 1; 1 < a \leq 2.$$

Ответ: $-2 \leq a < -1; -1 < a < 1; 1 < a \leq 2$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получено множество значений a , отличающееся от искомого только исключением точек $a = -2$ и/или $a = 2$	3
С помощью верного рассуждения получен промежуток $(-2; 2)$ множества значений a , возможно, с включением граничных точек ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Получены корни уравнения $3x^2 + 2ax + 1 = (x^2 + ax + 1)^2$: $x = 0$, $x = 1 - a$, $x = -1 - a$; и задача верно сведена к исследованию полученных корней при условии $x^2 + ax + 1 > 0$ ($x^2 + ax + 1 \geq 0$)	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Задача 2.

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^2 + 5x + y^2 - y - |x - 5y + 5| = 52, \\ y - 2 = a(x - 5) \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

Решение.

Изобразим на координатной плоскости множество точек, координаты которых удовлетворяют первому уравнению системы.

Рассмотрим два случая:

1) Если $x - 5y + 5 \geq 0$, то получаем уравнение

$$\begin{aligned} x^2 + 5x + y^2 - y - x + 5y - 5 &= 52; \\ x^2 + 4x + y^2 + 4y - 57 &= 0; \\ (x + 2)^2 + (y + 2)^2 &= 65. \end{aligned}$$

Полученное уравнение задаёт окружность с центром в точке $O_1(-2; -2)$

и радиусом $\sqrt{65}$.

2) Если $x - 5y + 5 \leq 0$, то получаем уравнение

$$x^2 + 5x + y^2 - y + x - 5y + 5 = 52; \quad x^2 + 6x + y^2 - 6y - 47 = 0; \quad (x + 3)^2 + (y - 3)^2 = 65.$$


Полученное уравнение задаёт окружность с центром в точке $O_2(-3; 3)$ и радиусом $\sqrt{65}$.

Полученные окружности пересекаются в двух точках $A(-10; -1)$ и $B(5; 2)$, лежащих на прямой $x - 5y + 5 = 0$, поэтому в первом случае получаем дугу ω_1 с концами в точках A и B , во втором — дугу ω_2 с концами в тех же точках (см. рис.).

Рассмотрим второе уравнение системы. Оно задаёт прямую m , которая проходит через точку B и угловой коэффициент которой равен a .

При $a = \frac{1}{5}$ прямая m проходит через точки A и B , то есть исходная система имеет два решения.

При $a = -\frac{7}{4}$ прямая m перпендикулярна прямой O_1B , угловой коэффициент которой равен $\frac{4}{7}$, значит, прямая m касается дуги ω_1 в точке B и пересекает дугу ω_2 в двух точках (одна из которых — точка B), то есть исходная система имеет два решения.



При $a = 8$ прямая m перпендикулярна прямой O_2B , угловой коэффициент которой равен $-\frac{1}{8}$, значит, прямая m касается дуги ω_2 в точке B и пересекает дугу ω_1 в двух точках (одна из которых — точка B), то есть исходная система имеет два решения.

При $a < -\frac{7}{4}$ или $a > 8$ прямая m пересекает каждую из дуг ω_1 и ω_2 в точке B и ещё в одной точке, отличной от точки A , то есть исходная система имеет три решения.

При $-\frac{7}{4} < a < \frac{1}{5}$ прямая m пересекает дугу ω_2 в двух точках (одна из которых — точка B) и не пересекает дугу ω_1 в точках, отличных от точки B , то есть исходная система имеет два решения.

При $\frac{1}{5} < a < 8$ прямая m пересекает дугу ω_1 в двух точках (одна из которых — точка B) и не пересекает дугу ω_2 в точках, отличных от точки B , то есть исходная система имеет два решения.

Значит, исходная система имеет ровно два решения при $-\frac{7}{4} \leq a \leq 8$.

Ответ: $-\frac{7}{4} \leq a \leq 8$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получено множество значений a , отличающееся от искомого только исключением точек $a = -\frac{7}{4}$ и/или $a = 8$	3
При всех значениях a верно найдено количество решений системы в одном из двух случаев, возникающих при раскрытии модуля ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию взаимного расположения дуг окружностей и прямых (аналитически или графически)	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Примеры оценивания решений задания 18

Пример 1.

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{3x^2 + 2ax + 1} = x^2 + ax + 1 \text{ имеет ровно три различных корня.}$$

Ответ: $-2 \leq a < -1$; $-1 < a < 1$; $1 < a \leq 2$.

$$\begin{aligned}
 \text{18. } \sqrt{3x^2 + 2ax + 1} &= x^2 + ax + 1 \Leftrightarrow \sqrt{3(x^2 + \frac{2}{3}ax + \frac{1}{3})} = x^2 + \frac{a}{2}x + \frac{1}{2} \\
 \Leftrightarrow \sqrt{3(x + \frac{a}{3})^2 + 1 - \frac{a^2}{3}} &= (x + \frac{a}{2})^2 + 1 - \frac{a^2}{4} \quad \text{т.к. } (x^2 + ax + 1) \geq 0 \\
 \Leftrightarrow 3(x + \frac{a}{3})^2 + 1 - \frac{a^2}{3} &= (x + \frac{a}{2})^2 + 1 - \frac{a^2}{4} \quad \text{т.к. } x^2 + ax + 1 \geq 0 \\
 \Leftrightarrow 3x^2 + 2ax + 1 &= (x^2 + ax + 1)^2 \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + ax + 1 \geq 0 \\ 3x^2 + 2ax + 1 = x^4 + 2ax^2 + x^2/2 + 2 + a^2 + 2ax + 1 = 0 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + ax + 1 \geq 0 \\ x^2(x^2 + 2ax + a^2 - 1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + ax + 1 \geq 0 \\ \begin{cases} x=0 \\ x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ \begin{cases} x^2 + ax + 1 \geq 0 \quad (2) \\ x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0 \quad (1) \end{cases} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Для того чтобы система имела 3 различных решения, необходимо, чтобы
(1) имело 2 различных решения не равных 0 и удовлетворяющие (2), т.к. $g(x) = x^2 + 2ax + a^2 - 1$,
 $f(x) = x^2 + ax + 1$; $\text{т.к. } f(x) \neq 0 \Rightarrow g(0) = 0 \Rightarrow a^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow a = \pm 1 \Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ a = 1 \end{cases}$

$$\begin{aligned}
 \text{Заметим, что } (1) \text{ и } x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow (x + a)^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow (x + a - 1)(x + a + 1) = 0 \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - a \\ x = -1 - a \end{cases}; \text{ тогда } (2) \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 + ax + 1 \geq 0 \\ x = 1 - a \\ x = -1 - a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 1 - 2a + a^2 + a - a^2 + 1 \geq 0 \\ x = 1 - a \\ 1 + 2a + a^2 - a - a^2 + 1 \geq 0 \\ x = -1 - a \end{cases} \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ a \in \mathbb{R} \\ x = 1 - a \\ x = -1 - a \end{cases} \quad \text{таким образом, система имеет три различных решения, если } a \neq -1 \text{ и } a \neq 1. \\
 (3) \quad (4) \quad (3) \text{ и } (4) \text{ и } (2) \text{ и } (1) \text{ имеют различные, но равные}
 \end{aligned}$$

нуль решения; $\text{т.к. } 1 - a = -1 - a \Leftrightarrow 1 = -1 \Rightarrow$ таких a не существует. (3) имеет рим. равное 0

при $a = -1$ - не подходит, (4) имеет рим. = 0 при $a = 1$ - не подходит.

(3) имеет рим. при $a \geq -2$; (4) имеет рим. при $a \leq 2 \Rightarrow (3) \text{ и } (4) \text{ имеют}$
различные рим. от 0 при $a \in [-2; 2]$ и $a \neq \pm 1$

Ответ: $a \in [-2; -1) \cup (-1; 1) \cup (1; 2]$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ.

Оценка эксперта: 4 балла.

Пример 2.

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{3x^2 + 2ax + 1} = x^2 + ax + 1 \text{ имеет ровно три различных корня.}$$

Ответ: $-2 \leq a < -1$; $-1 < a < 1$; $1 < a \leq 2$.

$$\sqrt{3x^2 + 2ax + 1} = x^2 + ax + 1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2 + ax + 1 \geq 0 \\ 3x^4 + 2ax^2 + 1 = x^4 + a^2x^2 + x^2 + 2ax^3 + 2ax^2 + 1 \end{array} \right. \Rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2 + ax + 1 \geq 0 \\ x^4 + a^2x^2 - x^2 + 2ax^3 = 0. \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2 + ax + 1 \geq 0 \\ x^2(x^2 + a^2 - 1 + 2ax) = 0. \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2 + ax + 1 \geq 0 \\ \vdots \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2 + ax + 1 \geq 0 \\ x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0. \end{array} \right.$$

Уравнение имеет решение, когда

$$x^2 + 2ax + a^2 - 1 \text{ имеет 2 корня и}$$

оно удовлетворяет неравенству $x^2 + a^2 + 1 \geq 0$.

$$x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0$$

$$(x+a)^2 - 1 = 0$$

$$(x+a-1)(x+a+1) = 0.$$

$$\left[\begin{array}{l} x = -a+1 \\ x = -a-1 \end{array} \right. \text{Решим для } x \text{ в } x^2 + ax + 1 \geq 0.$$

$$1) (-a+1)^2 + a(-a+1) + 1 \geq 0. \quad 2) (-a-1)^2 + a(-a-1) + 1 \geq 0$$

$$a^2 - 2a + 1 - a^2 + a + 1 \geq 0. \quad a^2 + 2a + 1 - a^2 - a + 1 \geq 0$$

$$-a + 2 \geq 0 \quad a \leq 2$$

$$2a + 2 \geq 0$$

$$a \in [-1, 2].$$

$$a \geq -1.$$

Найдите значение a , когда оно совпадет:

3 случая

$$1) -a+1 = -a-1 \quad 1) \text{ - 1-е решение}$$

$$2) 0 = -a+1 \quad 2) a = 1 \quad \left. \begin{array}{l} 2) a = 1 \\ 3) a = -1. \end{array} \right\} \text{ - выполняется это}$$

$$3) 0 = -a-1 \quad 3) a = -1. \quad \text{тогда}$$

1)

$$a \in (-1, 1) \cup (1, 2].$$

Ответ: $(-1, 1) \cup (1, 2]$. Уравнение имеет 3 различ. корня.

Комментарий.

Решение логично, все шаги присутствуют, но при решении неравенства в пункте 2) допущена ошибка вычислительного характера, что соответствует критерию на 2 балла.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 3.

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{3x^2 + 2ax + 1} = x^2 + ax + 1 \text{ имеет ровно три различных корня.}$$

Ответ: $-2 \leq a < -1$; $-1 < a < 1$; $1 < a \leq 2$.

№ 18
 $\sqrt{3x^2 + 2ax + 1} = x^2 + ax + 1$ (1); $a?$
 \uparrow ур-е имеет 3 различных корня

1) ОДЗ: $x^2 + ax + 1 \geq 0$

$x^2 + ax + 1 = 0$; $x^2 + ax + 1 \geq 0$, если $D \leq 0$, т.к.
 $D = a^2 - 4$ как тогда на графике будем расположаться
 вершина параболы
 выше ток как корн, при x^2
 т.к. $x^2 > 0$

так, как на рисунках ① или ②



$D \leq 0 \Rightarrow a^2 - 4 \leq 0$; $(a-2)(a+2) \leq 0$ $\xrightarrow{-2 \quad 2}$
 $\Rightarrow a \in [-2; 2]$ (≠)

2) ~~уравнение~~ при $a \in [-2; 2]$ безврдешим обе части
 уравнения в квадрат, тогда

$$\begin{aligned} 3x^2 + 2ax + 1 &= (x^2 + ax + 1)^2 \\ 3x^2 + 2ax + 1 &= (x^2 + ax)^2 + 2(x^2 + ax) + 1 \\ 3x^2 + 2ax + 1 &= x^4 + 2ax^3 + a^2x^2 + 2x^2 + 2ax + 1 \\ x^4 + 2ax^3 + (a^2 + 2 - 3)x^2 + 2ax + 1 &= 0 \\ x^2 \cdot (x^2 + 2ax + a^2 - 1) &= 0 \end{aligned}$$

$\left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0 \end{array} \right]$ чтобы уравнение имело ровно 3
 различных корня нужно, чтобы
 $x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0$ имело только 2 корня,
 откуда 0 не будет другим

$x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0$ (**)

$\frac{D}{4} = a^2 - a^2 + 1 = 1 \Rightarrow x_{1,2} = -a \pm 1$

$x_1 \neq x_2$, т.к. $-a + 1 = -a - 1 \Rightarrow 1 = -1$ - неверно
 \Rightarrow уравнение (*) имеет 2 различных корня при $\forall a$ из ОДЗ
 \Rightarrow Уравнение имеет 3 различных корня при $\forall a$ из ОДЗ,
 то есть $a \in [-2; 2]$

Ответ: $a \in [-2; 2]$

Комментарий.

Получены корни уравнения $x = 0$, $x = 1 - a$, $x = -1 - a$ и задача сведена к исследованию полученных корней при условии $x^2 + ax + 1 \geq 0$ (есть только указание).

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 4.

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$\sqrt{3x^2 + 2ax + 1} = x^2 + ax + 1$ имеет ровно три различных корня.

Ответ: $-2 \leq a < -1$; $-1 < a < 1$; $1 < a \leq 2$.

Уравнение № 18.

$$③ x^4 + a^2 x^2 - x^2 + R a x^3 = 0 \quad x^4 + a x^2 + 1 > 0 \quad (*) \quad \text{решено вспомогательно}$$

$$x^2(x^2 + a^2 - 1 + R a x) = 0$$

$x \neq 0$

- кратность

которой

не-е будет

меньше

известного

он

наименьшая

а

$$x^4 + R a x^2 + a^2 - 1 = 0$$

решено кратность 2

$$R a - a^2 / (a^2 - 1) > 0$$

$$R^2 - a^2 + 1 > 0$$

если это

меньше а

$$x_{1,2} = \frac{-a \pm 1}{2}$$

$$x_1 = -a + 1 \quad x_2 = -a - 1$$

$$x_1 x_2 = -a + 1 \cdot -a - 1$$

если это

меньше а

$x_1 x_3$

$$-a + 1 \neq 0$$

$\boxed{a \neq 1}$

$$-a - 1 \neq 0$$

$\boxed{a \neq -1}$

$$(*) : x_1 = -a + 1$$

$$(a+1)^2 + a(-a+1) + 1 > 0$$

$$(1-a)^2 - a^2 + a + 1 > 0$$

$$1 - 2a + a^2 - a^2 + a + 1 > 0$$

$$2 - a > 0$$

$$\boxed{a < 2}$$

$$2 - a > 0$$

$$a > -2$$

Пример 5.

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^2 + 5x + y^2 - y - |x + 5y + 5| = 52, \\ y - 2 = a(x - 5) \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

Ответ: $-8 \leq a \leq \frac{7}{4}$.

$$\begin{cases} x^2 + 5x + y^2 - y - |x + 5y + 5| = 52 & (1) \\ y - 2 = a(x - 5) & (2) \end{cases}$$

(1) $\begin{cases} x + 5y + 5 \geq 0 \\ x^2 + 5x + y^2 + y - x - 5y - 5 = 52 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y \geq -\frac{x+5}{5} \\ x^2 + 4x + y^2 - 4y - 5 = 52 \end{cases}$

$\begin{cases} y \leq -\frac{x+5}{5} \\ x^2 + 5x + y^2 + y + x + 5y + 5 = 52 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y \leq -\frac{x+5}{5} \\ x^2 + 6x + y^2 + 6y = 42 \end{cases}$

$\begin{cases} y \geq -\frac{x+5}{5} & (1.1) \\ (x+2)^2 + (y-2)^2 = 65 & R_1 = \sqrt{65} \text{ - уп-е окр-и с центром } C_1(-2; 2) \text{ и} \\ y \leq -\frac{x+5}{5} & (1.2) \\ (x+3)^2 + (y+3)^2 = 65 & \text{уп-е окр-и с центром } C_2(-3; -3) \text{ и} \\ R_2 = R_1 = \sqrt{65} & \end{cases}$

(1.1) $\begin{cases} y \geq -\frac{x+5}{5} \\ (x+2)^2 + (y+2)^2 = 65 \end{cases} \Rightarrow$

из пересечения с прямой $y = -\frac{x+5}{5}$

$$\begin{aligned} (x+2)^2 + \left(-\frac{x+5}{5} - 2\right)^2 &= 65 \\ (x+2)^2 + \left(-\frac{(x+5) + 10}{5}\right)^2 &= 65 \\ (x+2)^2 + \frac{(x+5+10)^2}{25} &= 65 \\ (x+2)^2 + \frac{125+15x+25}{25} &= 65 \\ x^2 + 4x + 4 + \frac{x^2 + 30x + 225}{25} &= 65 \\ 25x^2 + 100x + 100 + x^2 + 30x + 225 &= 65 \cdot 25 = 0 \\ 26x^2 + 130x - 1300 &= 0 \\ 2x^2 + 10x - 100 &= 0 \\ x^2 + 5x - 50 &= 0 \\ x = -25 \pm \sqrt{225} &= -25 \pm 15 \\ x_1 = -5 & , y_1 = -\frac{5+5}{5} = -2 \\ x_2 = -10 & , y_2 = \frac{10-5}{5} = 1 \end{aligned}$$

$$1.2.1) \quad \begin{cases} y < -\frac{x-5}{5} \\ (x+3)^2 + (y+3)^2 = 65 \end{cases}$$

$$\text{и решаем уравнение } y = -\frac{x-5}{5}$$

$$(x+3)^2 + \frac{(x+5-15)^2}{25} = 65$$

$$25x^2 + 6 \cdot 25x + 9 \cdot 25 + (x-10)^2 - 65 \cdot 25 = 0$$

$$25x^2 + 150x + 225 - 20x + 100 - 1625 = 0$$


$$25x^2 + 130x - 1300 = 0$$

$$x^2 + 5x - 50 = 0$$

$$x_3 = x_1 = 5, \quad y_3 = y_1 = -2$$

$$x_4 = x_2 = -10, \quad y_4 = y_2 = 1$$

(2) $y = a(x-5) - 2$ - прямая проходит, проходя через точку $A(5, -2)$ с угловым коэффициентом a и точку Q .



при $a = 0$ - 2 реш. 8

находим a , при к-м $y = a(x-5) - 2$ касается окружности с ц. в. в Q .

$$(x+2)^2 + (a(x-5)-2-2)^2 = 65$$

$$x^2 + 4x + 4 + (a(x-5) - 4)^2 = 65$$

$$x^2 + 4x + 4 + a^2(x-5)^2 - 8a(x-5) + 16 = 65$$

$$x^2 + 4x + a^2(x^2 - 10x + 25) - 8ax + 40a - 45 = 0$$

$$\cancel{x^2} + x^2(1+a^2) + x(4 - 10a^2 - 8a) + 25a^2 + 40a - 45 = 0$$

$$\frac{D}{4} = (2 - 5a^2 - 4a)^2 - (a^2 + 1)(25a^2 + 40a - 45) =$$

$$(5a^2 + 4a - 2)^2 - (a^2 + 1)(25a^2 + 40a - 45) = 0$$

$$\begin{aligned}
 25x^4 + 40x^3 + 16x^2 - 28x^2 - 16x + 4 - 25x^4 - 40x^3 + 45x^2 - \\
 - 25x^2 - 40x + 45 = 16x^2 - 40x + 45 - 16x + 4 = \\
 - 16x^2 - 56x + 49 = 0 \quad (\text{т.к. ур-е должно иметь неотрицательные корни})
 \end{aligned}$$

$$16x^2 - 56x + 49 = 0$$

$$\frac{D}{4} = 28^2 - 16 \cdot 49 = 0$$

$$(4x - 7)^2 = 0$$

$$\text{при } x = \frac{7}{4} - 3 \text{ реш-я}$$

$$\text{при } x > \frac{7}{4} - 3 \text{ реш-я}, \text{ при } x < 0; \frac{7}{4} - 3 \text{ реш-я}$$

найдём a , прик-е $y = a(x-5) - 2$ на с. отр-я u

отв a

$$x^2 + 6x + (a(x-5) - 2)^2 + 6(a(x-5) - 2) - 4x = 0$$

$$x^2 + 6x + a^2(x-5)^2 - 4a(x-5) + 4 + 6a(x-5) - 12 - 4x = 0$$

$$x^2 + 6x + a^2(x^2 - 10x + 25) - 4ax + 20a + 6ax - 30a - 55 = 0$$

$$x^2(1 + a^2) + 6x - 10a^2x + 25a^2 + 2ax - 40a - 55 = 0$$

$$x^2(a^2 + 1) + x(6 - 10a^2 + 2a) + 25a^2 - 10a - 55 = 0$$

$$\frac{D}{4} = (3 + a - 5a^2)^2 - (a^2 + 1)(25a^2 - 10a - 55) =$$

$$\begin{aligned}
 &= 9 + 6(a - 5a^2) + (a - 5a^2)^2 - 25a^4 + 10a^3 + 55a^2 - \\
 &- 25a^2 + 10a + 55 = \cancel{6a^3} \cancel{6a^2} \cancel{325a^4} - 10a^3 + a^2 + 6a - 50a^2 + \\
 &+ 9 - 25a^4 + 10a^3 + 55a^2 - 25a^2 + 10a + 55 = a^2 + 16a + 64
 \end{aligned}$$

$$a^2 + 16a + 64 = 0 \quad (\text{т.к. ур-е должно иметь неотрицательные корни})$$

$$(a + 8)^2 = 0$$

$$\text{при } a = -8 - 3 \text{ реш-я}$$

$$\text{при } a < -8 - 3 \text{ реш-я}, \text{ при } a < 1 - 8; 0) - 2 \text{ реш-я}$$

Ответ: 2 реш-я при $a \in (-8, 0) \cup (0; \frac{7}{4})$ и 1 , т.е. при $a \in (-8; \frac{7}{4})$

Комментарий.

Ход решения ясен, изложен более чем подробно. Ошибок нет, кроме недочета: концы промежутка не включены в ответ.

Оценка эксперта: 3 балла.

Пример 6.

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^2 + 5x + y^2 - y - |x + 5y + 5| = 52, \\ y - 2 = a(x - 5) \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

Ответ: $-8 \leq a \leq \frac{7}{4}$.

Решение:

$$\begin{cases} x^2 + 5x + y^2 + y - |x + 5y + 5| = 52 \\ y - 2 = a(x - 5) \end{cases}$$


Рассмотрим 2 случая при $x + 5y + 5 \geq 0$ и при $x + 5y + 5 < 0$

$$\begin{cases} x^2 + 5x + y^2 + y - x - 5y - 5 = 52 \\ x + 5y + 5 \geq 0 \\ x^2 + 5x + y^2 + y + x + 5y + 5 = 52 \\ x + 5y + 5 < 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x^2 + 5x + y^2 + y - x - 5y - 5 = 52 \\ x + 5y + 5 \geq 0 \\ x^2 + 5x + y^2 + y + x + 5y + 5 = 52 \\ x + 5y + 5 < 0 \end{cases}$$

Построим *эскиз* *график* *об.*

$$\begin{cases} (x+2)^2 + (y-2)^2 = 65 - \text{графиком ф-ии} \\ y \geq -\frac{x}{5} - 1 \quad \text{является окр.} \\ \text{с центром } (-2; 2) \text{ и} \\ r = \sqrt{65} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x+5)^2 + (y+3)^2 = 65 - \text{графиком} \\ \text{ф-ии является} \\ \text{окр. с центром} \\ (-3; -3) \text{ и } r = \sqrt{65}. \end{cases}$$



Рассмотрим $y + 2 = a(x - 5)$.

$y = a(x - 5) - 2$. — графиком ф-ии является множество прямых, проходящих через точку $(5; -2)$. Тогда, где касание окр. $(-2; 2); \sqrt{65}$

a должно быть равно -5 , а где касание окр. $(-3; -3); \sqrt{65}$. a должно быть равно $\frac{7}{4}$.

при $a \in [-8; \frac{7}{4}]$ система имеет 2 корня.

при $a \in (-\infty; -8) \cup (\frac{7}{4}; +\infty)$ система имеет 3 корня.

Ответ: $a \in [-8; \frac{7}{4}]$.

Комментарий.

Решение и ответ верные, хотя нет обоснования, почему для касания a « a должно быть равно -8 » или « $\dots 7/4$ ».

Оценка эксперта: 4 балла.

7. Критерии проверки и оценка решений заданий 19 ЕГЭ-2018

Содержательно задание №19 проверяет в первую очередь не уровень математической (школьной) образованности, а уровень математической культуры. Формирования культуры происходит на протяжении всех лет обучения (и не только в школе). Для решения этой задачи никаких фактов из теории чисел типа теоремы Вильсона, чисел Мерсенна, малой теоремы Ферма, теории сравнений и т.п. для решения этих заданий не требуется. Тот, кто эти факты знает, разумеется, может их использовать, но, подчёркиваем, при решении всегда можно обойтись и без них.

Условия задания №19 разбиты на пункты. По существу, задача разбита на ряд подзадач (частных случаев), последовательно решая которые можно в итоге справится с ситуацией в целом.

Задача 19 (демонстрационный вариант 2018 г.).

На доске написано более 40, но менее 48 целых чисел. Среднее арифметическое этих чисел равно -3 , среднее арифметическое всех положительных из них равно 4 , а среднее арифметическое всех отрицательных из них равно -8 .

- Сколько чисел написано на доске?
- Каких чисел написано больше: положительных или отрицательных?
- Какое наибольшее количество положительных чисел может быть среди них?

Решение. Пусть среди написанных чисел k положительных, l отрицательных и m нулей. Сумма набора чисел равна количеству чисел в этом наборе, умноженному на его среднее арифметическое, поэтому

$$4k - 8l + 0 \cdot m = -3(k + l + m).$$

- Заметим, что в левой части приведённого выше равенства каждое слагаемое делится на 4, поэтому $k + l + m$ — количество целых чисел — делится на 4.

По условию $40 < k + l + m < 48$, поэтому $k + l + m = 44$. Таким образом, написано 44 числа.

б) Приведём равенство $4k - 8l = -3(k + l + m)$ к виду $5l = 7k + 3m$. Так как $m \geq 0$, получаем, что $5l \geq 7k$, откуда $l > k$. Следовательно, отрицательных чисел больше, чем положительных.

в) Подставим $k + l + m = 44$ в правую часть равенства $4k - 8l = -3(k + l + m)$: $4k - 8l = -132$, откуда $k = 2l - 33$. Так как $k + l \leq 44$, получаем: $3l - 33 \leq 44$; $3l \leq 77$; $l \leq 25$; $k = 2l - 33 \leq 17$, то есть положительных чисел не более 17.

Приведём пример, когда положительных чисел ровно 17. Пусть на доске 17 раз написано число 4, 25 раз написано число -8 и 2 раза написан 0. Тогда $\frac{4 \cdot 17 - 8 \cdot 25}{44} = -3$; указанный набор удовлетворяет всем условиям задачи.

Ответ: а) 44; б) отрицательных; в) 17.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение пункта <i>a</i> ; — обоснованное решение пункта <i>b</i> ; — искомая оценка в пункте <i>c</i> ; — в пункте <i>c</i> приведён пример, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Задача 1.

В последовательности $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$, состоящей из целых чисел, $a_1 = 1$, $a_n = 235$. Сумма любых двух соседних членов последовательности равна 3, 5 или 25.

- Приведите пример такой последовательности.
- Может ли такая последовательность состоять из 1000 членов?
- Из какого наименьшего числа членов может состоять такая последовательность?

Решение.

- Например, последовательность 1, 2, 3, 0, 5, -2, 7, -4, ..., 233, -230, 235 удовлетворяет условию задачи (чередуются суммы чисел 3 и 5).
- Поскольку 3, 5 и 25 — нечётные числа, любые два соседних члена последовательности имеют разную чётность. На нечётных местах должны стоять нечётные числа, а на чётных — чётные. Число 235 нечётное, поэтому оно не может стоять на чётном месте. Значит, последовательность не может состоять из 1000 членов.

- Рассмотрим три члена последовательности: a_k, a_{k+1}, a_{k+2} ($1 \leq k \leq n-2$).

Поскольку $a_k + a_{k+1} \geq 3$, $a_{k+1} + a_{k+2} \leq 25$, получаем: $a_{k+2} \leq a_k + 22$.

В предыдущем пункте было показано, что последовательность должна состоять из нечётного числа членов. Пусть $n = 2m + 1$, тогда

$$a_n = a_{2m+1} \leq a_{2m-1} + 22 \leq a_{2m-3} + 22 \cdot 2 \leq \dots \leq a_1 + 22 \cdot m; 235 \leq 1 + 22m,$$

откуда $m \geq 11$. Значит, последовательность состоит не менее чем из 23 чисел. Приведём пример последовательности, удовлетворяющей условию задачи, состоящей из 23 членов: 1, 2, 23, -20, 45, -42, 67, -64, 89, -86, 111, -108, 133, -130, 155, -150, 175, -170, 195, -190, 215, -210, 235.

Ответ: а) например, 1, 2, 3, 0, 5, -2, 7, -4, ..., 233, -230, 235; б) нет; в) 23.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — пример в п. а; — обоснованное решение п. б; — искомая оценка в п. в; — пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Задача 2.

На доске написано 30 натуральных чисел (числа могут повторяться), каждое из которых либо зелёного, либо красного цвета. Каждое зелёное число кратно 3, а каждое красное число кратно 7. При этом все зелёные числа различны и все красные различны (какое-то зелёное число может равняться какому-то красному числу).

а) Может ли сумма написанных чисел быть меньше $1395 = 3 + 6 + \dots + 90$, если все числа на доске кратны 3?

б) Может ли ровно одно число на доске быть красным, если сумма написанных чисел равна 1067?

в) Какое наименьшее количество красных чисел может быть на доске, если сумма написанных чисел равна 1067?

Решение.

а) Если на доске записано 29 зелёных чисел: 3, 6, ..., 87 — и одно красное число 21, то их сумма меньше 1395.

б) Пусть на доске ровно одно красное число. Тогда зелёных чисел 29, а их сумма не меньше, чем сумма 29 наименьших чисел, делящихся на 3:

$$3 + 6 + \dots + 87 = \frac{90 \cdot 29}{2} = 1305.$$

Это противоречит тому, что сумма написанных чисел равна 1067.

в) Пусть на доске написано n красных чисел и $30 - n$ зелёных чисел. Тогда

$$\text{сумма красных чисел не меньше } 7 + 14 + \dots + 7n = \frac{7n^2 + 7n}{2},$$

а сумма зелёных чисел не меньше

$$3 + 6 + \dots + 3(30 - n) = \frac{3(31 - n)(30 - n)}{2} = \frac{3n^2 - 183n + 2790}{2}.$$

Таким образом, $1067 \geq 5n^2 - 88n + 1395$; $5n^2 - 88n + 328 \leq 0$, откуда, учитывая, что n — целое, получаем $n \geq 6$.

Приведём пример 6 красных чисел и 24 зелёных чисел, сумма которых равна 1067: 7, 14, 21, 28, 35, 56, 3, 6, ..., 66, 69, 78.

Ответ: а) да; б) нет; в) 6.

Содержание критерия	Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты	4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов	2
Верно получен один из следующих результатов: — обоснованное решение пункта а; — обоснованное решение пункта б; — искомая оценка в пункте в; — пример в пункте в, обеспечивающий точность предыдущей оценки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	
4	

Примеры оценивания решений задания 19

Пример 1.

В последовательности $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$, состоящей из целых чисел, $a_1 = 1, a_n = 235$. Сумма любых двух соседних членов последовательности равна 3, 5 или 25.

- а) Приведите пример такой последовательности.
- б) Может ли такая последовательность состоять из 1000 членов?
- в) Из какого наименьшего числа членов может состоять такая последовательность?

Ответ: а) например, 1, 2, 3, 0, 5, -2, 7, -4, ..., 233, -230, 235; б) нет; в) 23.

б) Нет. Р.к. в этой посл. $a_i + a_{i+1} = \begin{cases} 3 \\ 5 \\ 25 \end{cases} \Rightarrow$
р.к. a_1 - неч., то все чётные члены - чёт.,
а нечётные - неч. $\Rightarrow a_n = 235$ - неч член р.к.
 n не 1000. \Rightarrow невозможн. не может.

в) 23

а) 1; -26; 51; -46; 71; -66; 91; -86; 111; -106; 131;
-126; 151; -146; 171; -166; 191; -188; 213; -210; 235

Комментарий.

В пункте а допущена ошибка – сумма первых двух чисел равна -25. При ответе на вопрос пункта б участник экзамена верно показал, что случай $n=1000$ невозможен.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 2.

В последовательности $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$, состоящей из целых чисел, $a_1 = 1, a_n = 235$. Сумма любых двух соседних членов последовательности равна 3, 5 или 25.

- Приведите пример такой последовательности.
- Может ли такая последовательность состоять из 1000 членов?
- Из какого наименьшего числа членов может состоять такая последовательность?

Ответ: а) например, 1, 2, 3, 0, 5, -2, 7, -4, ..., 233, -230, 235; б) нет; в) 23.

19) А) Пример такой последовательности:

1, 3, 0, 5, -2, 7, -4, 9, -6, 11, -8, 13, -10, 15, -12, 17, -14, 19, -16, 21, -18, 23, -20, 25, -22, 27, -24, 29, -26, 31, -28, 33, -30, 35, -32, 37, -34, 59, -56, 81, -78, 103, -100, 125, -122, 147, -144, 169, -166, 191, -188, 213, -210, 235.

б) Да, например, последовательность, членами которой являются чередующиеся числа 0 и 3.

0, 3, 0, 3, 0, 3...

Сумма любых двух соседних членов в последовательности равна 3, что соответствует условию.

В последовательности, состоящей из 1000 членов, будет 333 члена 0 и 334 члена 3. Все нечётные члены последовательности будут нулями, все чётные — тройками.

Комментарий.

В пункте а верно приведен пример. Решение пункта б неверно.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 3.

На доске написано 30 натуральных чисел (числа могут повторяться), каждое из которых либо зелёного, либо красного цвета. Каждое зелёное число кратно 3, а каждое красное число кратно 7. При этом все зелёные числа различны и все красные различны (какое-то зелёное число может равняться какому-то красному числу).

а) Может ли сумма написанных чисел быть меньше $1395 = 3 + 6 + \dots + 90$, если все числа на доске кратны 3?

б) Может ли ровно одно число на доске быть красным, если сумма написанных чисел равна 1067?

в) Какое наименьшее количество красных чисел может быть на доске, если сумма написанных чисел равна 1067?

Ответ: а) да; б) нет; в) 6.

а) $1395 = 3 + 6 + \dots + 90$ - 30 чисел. *Прямоугольник из 30 единиц.*

Да, может, т.к. мы можем заменить число 90 на число 21, *прямоугольник другим цветом (красным),* *и в итоге одно единица останется на 1969 - 2.т.г.*

б) Возьмём наименьшую сумму чисел написанных только зелёных.

Это $1395 = 3 + 6 + \dots + 90$ К нам нужно что добавить одно красное число. Для того, чтобы минимальное добавить одно красное самое большое зелёное - 90 и добавление минимальное красное - 7 Итоговая сумма $1395 - 90 + 7 = 1312 > 1067 \Rightarrow$ *нельзя*.

в) Числа при делении на 3 дают остатки при делении на 7

6 единиц неравнозначны: 3 6 2 5 1 4 0

Число 1067 даёт остаток 3 при делении на 7 \Rightarrow

Это зелёные числа дают остаток 3 при делении на 7

Они не могут попасть в $3 + 6 + \dots + 72 = 1067 \Rightarrow 1067 - 1067 = 0 \Rightarrow$

= они дают остаток на 6.

$3 + \dots + 6 = 6 \cdot 11 = 66, 1067 - 66 = 1001, 1001 \div 7 = 143 \dots 0$

Комментарий.

Приведено верное решение пункта а. Приведено верное решение пункта б. Решение в пункте в не завершено.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 4.

На доске написано 30 натуральных чисел (числа могут повторяться), каждое из которых либо зелёного, либо красного цвета. Каждое зелёное число кратно 3, а каждое красное число кратно 7. При этом все зелёные числа различны и все красные различны (какое-то зелёное число может равняться какому-то красному числу).

- а) Может ли сумма написанных чисел быть меньше $1395 = 3 + 6 + \dots + 90$, если все числа на доске кратны 3?

б) Может ли ровно одно число на доске быть красным, если сумма написанных чисел равна 1067?

в) Какое наименьшее количество красных чисел может быть на доске, если сумма написанных чисел равна 1067?

Ответ: а) да; б) нет; в) б.

a) Да, спасибо:

$$\underbrace{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, \dots 87}_{\text{3-е число}} \quad ; \quad \begin{array}{l} 21 \\ | \\ \text{кратное} \end{array}$$

Сумма засел¹³²⁶ < 1395, т.к. за заселение
25.

5) Найдем минимально возможную сумму с огнем красных чисел.

Т.к. сумма $\rightarrow \min \Rightarrow$ красное число = 7, зеленые - 3, 6, 9, 12, 15, 18, ..., 87.

$\sum_{\text{measured}} = 1305 + 7 = 1312 > 1067 \Rightarrow$ He measured
Oberlin! \checkmark

6) Пусть $f(n)$ - функция, значение которой кратно минимуму возможной суммы для каждого n . Тогда n - кол-во красных чисел.

$$\begin{aligned}
 f(n) &= 7 \cdot \left(\frac{n \cdot (n+1)}{2} \right) + 3 \cdot \left(\frac{\cancel{6n} \cdot (30-n) \cdot (31-n)}{2} \right) = \\
 &= \frac{1}{2} \left(7n^2 + 7n + 3n^2 \cancel{- 3 \cdot 61n} + 3 \cdot 30 \cdot 31 \right) = \\
 &= \frac{1}{2} (10n^2 - 176n + 2790) = 5n^2 - 88n + 1395.
 \end{aligned}$$

найдем минимальное n (~~нечетное~~ \mathbb{Z}^+), такое что $f(n) \leq 1067$.

$$5n^2 - 88n + 1395 \leq 1067$$

$$5n^2 - 88n + 328 \leq 0$$

$$D = 44^2 - 328 \cdot 5 = 1936 - 1640 = 296.$$
$$n \in \left[\frac{44 - \sqrt{296}}{5}, \frac{44 + \sqrt{296}}{5} \right] \Rightarrow n = 6.$$

$$f(6) = 7 \cdot \frac{6 \cdot 7}{2} + 3 \cdot \frac{24 \cdot 25}{2} = 3(49 + 12 \cdot 25) = 3 \cdot 349 = 1047.$$

$$f(5) = 1380, \Rightarrow \text{запись } 5 \text{- неверна.}$$

Ответ: 6 - наименьшее кол-во красных
птиц.

7, 14, 21, 28, 35, 56.

3, 6, 9, 12, ..., 69, 78, 81

Комментарий.

Обоснованно получены верные ответы во всех пунктах.

Оценка эксперта: 4 балла.

Пример 5.

На доске написано 30 натуральных чисел (числа могут повторяться), каждое из которых либо зелёного, либо красного цвета. Каждое зелёное число кратно 3, а каждое красное число кратно 7. При этом все зелёные числа различны и все красные различны (какое-то зелёное число может равняться какому-то красному числу).

а) Может ли сумма написанных чисел быть меньше $1395 = 3 + 6 + \dots + 90$, если все числа на доске кратны 3?

б) Может ли ровно одно число на доске быть красным, если сумма написанных чисел равна 1067?

в) Какое наименьшее количество красных чисел может быть на доске, если сумма написанных чисел равна 1067?

Ответ: а) да; б) нет; в) 6.

а) *Из доски обозначали числа, которые можно числами*

а) *Может, так как одно и то же число может быть зеленым и красным.*
пример: $3_1, 6_1, \dots, 17_1, 21_2$

б) *Нет.*

Если только одно число красное, то в последовательности с наименьшим
числом $(3_1, 6_1, \dots, 17_1, 21_2)$ сумма равна 1392, что больше, чем 1067

в) 6.

найдите
В последовательности с наименее красными числами и наименьшей
суммой $(3_1, 6_1, \dots, 17_1, 21_2, 14_3, \dots, 35_6)$ сумма равна 1077, $1077 > 1067$
однако числа будем писать красными, если в последовательности выше найдут зелеными
 66_{22} и 56_{22} .

Комментарий.

Обоснованно получен ответ в пунктах а и б. В решении пункта в есть логическая ошибка: не доказано, что красных чисел не может быть меньше 5. Взяв пять красных, нужно взять 25 зеленых чисел, а не 26. Кроме того, сумма чисел найдена неверно.

Оценка эксперта: 2 балла.

**Указания по оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ
для эксперта, проверяющего развернутые ответы
на задания 13–19 по МАТЕМАТИКЕ**

(документ предоставляемся эксперту при проведении оценивания экзаменационных работ вместе с критериями оценивания)

Эксперт, проверяющий задания с развернутым ответом, располагает следующими материалами:

- 1) тексты заданий;
- 2) возможный вариант решения каждой задачи 13–19;
- 3) критерии оценивания заданий 13–19.

При проверке заданий с развернутым ответом эксперт имеет возможность пользоваться непрограммируемым калькулятором.

В критериях оценивания выполнения заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ по математике для каждого задания приводится один возможный вариант решения. Однако предлагаемый разработчиками КИМ способ (метод) решения не является эталонным. Он лишь помогает эксперту в решении соответствующего задания.

Выполнение заданий оценивается в соответствии с критериями оценивания ответов на задания с развернутым ответом. Принципом построения системы оценивания является оценка продвижений участника экзамена в решении задачи в виде достижения формализованных в критериях промежуточных результатов. Максимальный балл выставляется только при наличии в тексте решения обоснованно полученного правильного ответа. Наличие в тексте решения недостатка в обосновании ответа или вычислительной ошибки не позволяет выставить за решение задания в соответствии с критериями максимальный балл. В случае, когда решение не подпадает ни под один из критериев положительных баллов (не достигнут ни один промежуточный математический результат), выполнение задания оценивается 0 баллов.

При использовании обобщенной схемы оценивания ответов на каждое из заданий 13–19 рекомендуется обращать внимание на следующие моменты:

- ✓ Перед проведением проверки выполнения каждого из заданий необходимо изучить критерии его оценивания в материалах для эксперта, обратив внимание на детализацию и конкретизацию обобщенной схемы оценивания применительно к конкретному заданию.

- ✓ Решение участника экзамена может иметь логику, отличную от логики решения, данного в критериях (альтернативное решение). В этом случае эксперт оценивает допустимость решения конкретной задачи тем способом, который выбрал участник экзамена. Если ход решения допустим, то *эксперт оценивает обоснованность этого решения на основании той совокупности свойств (признаков), формул или утверждений, которые соответствуют выбранному способу решения.*
- ✓ Участник экзамена может использовать без доказательства математические факты и формулы, содержащиеся в учебниках, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – Федеральный перечень).
- ✓ Если экзаменуемый использует в решении без доказательства формулы и факты, которые не представлены в учебниках, входящих в Федеральный перечень, то такое решение классифицируется как недостаточно обоснованное.
- ✓ Если математические преобразования, представленные в решении, не отражают основных необходимых логических шагов, то решение не может оцениваться максимальным баллом.
- ✓ Если при решении геометрической задачи использует рисунок, то ошибки в соотношении длин отрезков на рисунке, не влекут за собой снижения баллов за решение геометрической задачи, если на рисунке верно отображена геометрическая конфигурация и верно обозначены точки, описанные в решении.
- ✓ При проверке правильности решения необходимо проверять корректность промежуточных шагов решения, в том числе числовых выкладок (при необходимости, с помощью калькулятора). Наличие ошибок в промежуточных выкладках, даже не повлиявших на итоговый ответ, означает наличие математически некорректного перехода в решении задачи, что не позволяет оценить решение задачи максимальным баллом.
- ✓ Если участник экзамена решает задачу с другими числовыми данными, то такое решение задачи оценивается в 0 баллов, даже если он решают содержательно более сложную задачу.

- ✓ При проверке решения каждого из *заданий 13–19* необходимо вычленить в решении *три элемента*:
 - логика (последовательность и закономерность) решения,
 - обоснованность решения,
 - числовой ответ.

Количество логических шагов в решении и перечень условий и закономерностей зависит от выбранного способа решения. Это необходимо учитывать при применении критериев оценивания выполнения задания с развернутым ответом.

В процессе проверки необходимо придерживаться *следующих общих правил*:

- ✓ При работе эксперт выставляет свои оценки в протокол проверки развернутых ответов.
- ✓ Выставление баллов в протокол проверки развернутых ответов рекомендуется проводить по работам: все задания первой проверяемой работы, все задания второй проверяемой работы и т.д. Это позволяет обнаружить ошибки, допущенные экзаменуемым в нумерации задач, а также обнаружить непронумерованную, или пронумерованную неверно, или случайно пропущенную экспертом задачу. Ошибочное указание участником экзамена номера задачи, которую он выполняет, не может служить основанием для снижения оценки за фактически выполненное задание.
- ✓ Результаты оценивания переносятся в протокол проверки развернутых ответов, при этом баллы по каждому заданию переносятся в колонку, название которой соответствует номеру задания (см. Рисунок 1):
 - баллы по заданию **13** переносятся в колонку **13** протокола;
 - баллы по заданию **14** переносятся в колонку **14** протокола;
 - баллы по заданию **15** переносятся в колонку **15** протокола;
 - баллы по заданию **16** переносятся в колонку **16** протокола;
 - баллы по заданию **17** переносятся в колонку **17** протокола;
 - баллы по заданию **18** переносятся в колонку **18** протокола;
 - баллы по заданию **19** переносятся в колонку **19** протокола.
- ✓ Баллы выставляются в протокол проверки *гелевой черной ручкой*.
- ✓ Внесение изменений в протокол проверки крайне нежелательно. Все исправления вносятся *только поверх неверных записей*. Использование замазок и затирок с целью исправления записей категорически недопустимо!

Рисунок 1. Протокол проверки развернутых ответов 2018 года. Образец.

■ Протокол проверки развернутых ответов ■

 Регион 90 ФИО эксперта Иванов И.И. Примечание	Код предмета 2 ФИО эксперта Иванов И.И.	Название предмета Математика профильная (2018.03.30)	Номер протокола 1000009 Код эксперта 011224																					
Образец заполнения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 X																								
№	Код бланка	Позиции оценивания																						
		13	14	15	16	17	18	19																
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Дата проверки - - ■ ■ Подпись эксперта ■

Внимание! При выставлении баллов за выполнение задания в Протокол проверки развернутых ответов следует иметь в виду, что **если ответ отсутствует** (нет никаких записей, свидетельствующих о том, что экзаменуемый приступал к выполнению задания), то в протокол проставляется «X», а не «0». Если в работе записан только номер задания без попыток ее решения, то в протокол выставляется «0».

Пример 6.

На доске написано 30 натуральных чисел (числа могут повторяться), каждое из которых либо зелёного, либо красного цвета. Каждое зелёное число кратно 3, а каждое красное число кратно 7. При этом все зелёные числа различны и все красные различны (какое-то зелёное число может равняться какому-то красному числу).

а) Может ли сумма написанных чисел быть меньше $1395 = 3 + 6 + \dots + 90$, если все числа на доске кратны 3?

б) Может ли ровно одно число на доске быть красным, если сумма написанных чисел равна 1067?

в) Какое наименьшее количество красных чисел может быть на доске, если сумма написанных чисел равна 1067?

Ответ: а) да; б) нет; в) 6.

(19) а) Да, может. Например, вместо зелёного числа 24 можно написать красное число 21 (согласно, что красное число может равняться зелёному). Тогда сумма примет вид $3 + 6 + \dots + 21 + 21 + 27 + \dots + 90 = 1392 < 1395$.

Ответ: да, может.

б) Число 1067 имеет остаток 2 при делении на 3. Следовательно, красное число тоже должно иметь остаток 2 при делении на 3 (т.к. все зелёные числа имеют остаток 0). Наименьшее такое число - 14. Как известно из пункта а), сумма 30 наименьших зелёных чисел равна 1395. Если если заменить наибольшее из них (90) на 14, то сумма будет равна $1395 - 90 + 14 = 1319 > 1067$. Следовательно, такого быть не может.

Ответ: нет, не может.

в) $1395 - 1067 = 328 \Rightarrow$ в сумме $3 + 6 + \dots + 90$ необходимо так заменить несколько зелёных чисел на красные, чтобы суммарная разница между ними составила 328.

Во-первых, заметим, что за 5 замен это сделать невозможно, поскольку даже если заменить самое большое зелёное число (90, 87, 84, 81, 78) на самое маленькое красное (7, 14, 21, 28, 35), то суммарная разница составит $305 < 328$.

Во-вторых, заметим, что если вводится замена 72 на 49 ($72 - 49 = 23$), то суммарная разница составит как раз $328 (305 + 23 = 328) \Rightarrow$ ищем наименьшее количество красных чисел - 6.

Ответ: 6.

Комментарий.

Обоснованно получен ответ в пунктах **а** и **б**. В пункте **в** неверное обоснование, поскольку не доказано, что набор с **минимальным количеством** красных чисел получается заменой **максимальных** чисел из набора 3, 6, ..., 90 на **минимально возможные** различные красные числа. Кроме того, разница между пятью самыми большими зелёными числами и пятью самыми маленькими красными числами составляет 315.

Оценка эксперта: 2 балла.